UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AQUICULTURA

**DIFERENÇAS MORFOFISIOLÓGICAS DO TRATO
GASTROINTESTINAL DE TAINHAS *Mugil liza* PROVENIENTES
DE CRIAÇÃO E DO AMBIENTE**

DANIELA LEMES DA COSTA

FURG
RIO GRANDE, RS
2017

**DIFERENÇAS MORFOFISIOLÓGICAS DO TRATO GASTROINTESTINAL DE
TAINHAS *Mugil liza* PROVENIENTES DE CRIAÇÃO E DO AMBIENTE**

DANIELA LEMES DA COSTA

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Aquicultura no Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da Universidade Federal do Rio Grande

Orientador: Dr. Marcelo B. Tesser
Co-orientador: Dr. Luís Alberto Romano

RIO GRANDE, RS
JULHO/ 2017

FOLHA DE APROVAÇÃO

Sumário

RESUMO	V
INTRODUÇÃO GERAL	6
DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE	6
DISTRIBUIÇÃO E CICLO DE VIDA.....	7
IMPORTÂNCIA ECONÔMICA.....	9
CRIAÇÃO DE TAINHA	11
MORFOLOGIA DO TRATO.....	13
PLASTICIDADE E RESPOSTA À DIETA.....	15
OBJETIVOS.....	18
OBJETIVO GERAL	18
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
<i>CAPITULO ÚNICO: Artigo científico da presente dissertação para submissão em periódico internacional.</i>	25
Resumo.....	26
Introdução.....	28
Materiais e métodos.....	29
Animais utilizados e suas origens	29
Dissecação e aferições	30
Morfometria	30
Análise de pH.....	30
Análises histológicas.....	31
Análises estatísticas.....	31
Resultados	31
Morfometria	31
pH gastrointestinal	32
Histologia.....	33
Discussão.....	36
Conclusões	42
Referências bibliográficas	43

RESUMO

A tainha apresenta um trato gastrointestinal sofisticado, o que lhe permite aproveitar alimentos nutricionalmente pobres. Devido ao trato ser modulado pelos diferentes tipos de alimentos disponíveis no meio, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações morfofisiológicas do trato digestório de tainhas, *Mugil liza*, provenientes de diferentes ambientes. Foram utilizados 20 exemplares de *M. liza*, sendo cinco provenientes da praia do Cassino (PC), 10 da Lagoa dos Patos (LP). Destes, cinco foram mantidos por 147 dias em sistema de recirculação (LP-RAS) e cinco em de tanque rede por x dias (RAS-TR). Os organismos da LP-RAS foram alimentados duas vezes ao dia com ração comercial com 38% de PB e os de RAS-TR com 42% de PB. Todas as tainhas foram eutanasiadas com benzocaína (500 mg/L) e logo após os organismos da PC, LP e RAS-TR foram transportados até o laboratório em isopor com água+gelo (temperatura <4°C). Foram analisados o peso, comprimento total, quociente intestinal (QI), índice estomacal (IE), índice de conteúdo estomacal (ICE), pH do trato e distribuição de células caliciformes nos cecos e intestino. Os exemplares do ambiente apresentaram um QI, IE e ICE estatisticamente maior que o de cativeiro. O pH estomacal dos peixes RAS-TR foi mais ácido em relação aos da PC, sendo que os tratamentos LP e LP-RAS permaneceram em uma condição intermediária. A partir dos cecos não houve diferença no pH entre as diferentes origens, exceto no intestino médio. Foi verificado maior número de células caliciformes no intestino distal e cecos pilóricos, seguido do intestino proximal e intestino médio. Os dados sugerem que as alterações morfofisiológicas são adaptações moduladas pelo grau de facilidade de digestão e absorção dos nutrientes que cada alimento contém devido a sua composição, de modo que as rações por serem assimiladas mais rápido, tendem a reduzir o peso do estômago e a área de absorção do intestino. Além disso, acredita-se que a presença de alimentos mais proteicos aumenta a liberação de suco gástrico reduzindo o pH estomacal. O maior número de células caliciformes foi verificado justamente nos locais onde há necessidade de aumentar a absorção, lubrificação e proteção do epitélio

Palavras chaves: plasticidade, confinamento, fisiologia, moela, morfologia, Mugilídeos

INTRODUÇÃO GERAL

1 **DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE**

2 A tainha *Mugil liza* Valenciennes, 1836, pertence à família Mugilidae, ordem dos
3 Mugiliformes atualmente composta por 20 gêneros e 71 espécies (GONZÁLEZ-
4 CASTRO & GHASEMZADEH, 2016). O gênero *Mugil* é o único que ocorre no litoral
5 brasileiro com sete espécies (MENEZES et al., 2015). A identificação e caracterização
6 adequada das espécies de tainhas que ocorrem na região do Atlântico do sul do Caribe até
7 América do Sul é um pré-requisito para a compreender as semelhanças e suas diferenças
8 morfológicas, visto que algumas espécies dessas localidades já foram classificadas
9 erroneamente por serem similares (MENEZES et al., 2015). Anteriormente a *M. liza* era
10 classificada como *M. platanus*, no entanto, MENEZES et al. (2010) mostraram por meio
11 de estudos filogenéticos, que ambas são a mesma espécie, por esse motivo a última
12 denominação foi banida.

13 As espécies de Mugilidae apresentam morfologia externa e anatomia interna
14 notavelmente uniformes, dificultando a diferenciação entre elas por estes quesitos.
15 Usualmente são classificadas morfológicamente por medições de proporções corporais
16 que avaliam a posição relativa das narinas, o número e forma dos raios branquiais, os
17 comprimentos relativos das nadadeiras, a presença ou a ausência de uma pálpebra
18 adiposa, bem como o número de cecos pilóricos e o comprimento relativo do intestino
19 (GONZÁLEZ-CASTRO & MINOS, 2016)

20 O corpo da *M. liza* é moderadamente alongado, sem linha lateral (Figura I),
21 apresenta cor escura (cinza azulado) e prateada nas laterais e no ventre. Possui estrias
22 escuras horizontais, mais fortes na região superior das laterais e mais fracas na parte
23 inferior, desaparecendo completamente no ventre (FISCHER et al., 2011). A cabeça é
24 relativamente grande e achatada com os olhos parcialmente cobertos por tecido adiposo e
25 a boca pequena terminal (MENEZES et al., 2015).

Fonte: (FAO, 1999)

26 Figura I- Exemplar adulto de *Mugil liza* Valenciennes, 1836.

27

28 Todas as nadadeiras (exceto as pélvicas) apresentam coloração com cromatóforos
29 escuros. A primeira nadadeira dorsal tem quatro espinhos e a segunda nove raios (oito
30 ramificados e um não ramificado). Já a nadadeira peitoral tem de 14 a 17 raios
31 ramificados, sendo um não ramificado. A nadadeira pélvica tem um espinho e cinco raios
32 ramificados e a anal possui três espinhos e oito raios ramificados nos adultos e dois
33 espinhos e nove raios ramificados nos juvenis. As nadadeiras, dorsal e anal, podem ser ou
34 não cobertas na porção basal por pequenas escamas. Apresentam de 29 a 39 escamas na
35 série transversal e de 17 a 20 escamas no pedúnculo caudal. Possuem 24 ou 25 vértebras
36 e o primeiro arco branquial tem entre 22 e 80 rastros de modo que esta grande diferença é
37 devido ao fato de que o número aumenta à medida que o peixe cresce em comprimento
38 (MENEZES et al., 2015).

39 A tainha mede em média 50 cm de comprimento, mas existem relatos de até 100
40 cm e chega a pesar de 6 a 8 kg, sendo classificada como um peixe de médio porte (FAO,
41 1999)

42 ***DISTRIBUIÇÃO E CICLO DE VIDA***

43 A distribuição da *M. liza* se dá desde o Atlântico, nas águas costeiras ao redor das
44 Bermudas e do sul da Flórida, nas Índias Ocidentais, nas Bahamas e em todo o Mar do
45 Caribe até o sul até a Argentina (MENEZES et al., 2010; BARLETTA & DANTAS,
46 2016).

Fonte: (BARLETTA & DANTAS, 2016)

47 Figura II- Distribuição de tainhas *Mugil liza* na Costa Atlântica da América do Sul (margem em
 48 preto) e região do Caribe (área cinza)

49

50 É considerada uma espécie catádroma, eurialina e euritérmica (NETO & DIAS,
 51 2015; MENEZES et al., 2015; LEMOS et al., 2014; FISCHER et al., 2011; FAO, 1999)
 52 que passa a maior parte de seu ciclo de vida em ambientes estuarinos e inicia o processo
 53 de migração reprodutiva para o oceano no outono, para desovar no inverno (MENEZES
 54 et al., 2015). Após a desova, as larvas e juvenis retornam para os estuários, que são
 55 usados como ambientes de criação e alimentação (OLIVEIRA & BEMVENUTI, 2006).
 56 Os juvenis permanecem no estuário até a idade de primeira maturação, quando realizam a
 57 primeira migração reprodutiva (LEMOS et al., 2014).

58 **IMPORTÂNCIA ECONÔMICA**

59 A pesca e a criação da tainha já exerciam papel socioeconômico importante para
60 as civilizações do Egito antigo, na região do Mediterrâneo (LIAO et al., 2016). A
61 presença desses peixes foi registrada em túmulos de faraós datado em 2340 a.C.,
62 permanecendo até os dias atuais essa herança cultural (SADEK, 2016).

63 No início do século XVII, os asiáticos iniciaram a prática de processamento da
64 tainha pela técnica da salga da carne e da ova para consumo e exportação até os anos 90
65 quando teve um considerável declínio no estoque pesqueiro devido ao e aumento na
66 demanda, necessitando assim a importação de matéria prima (ovas, testículos e moelas)
67 de outros países como os Estados Unidos, Brasil, Austrália e República das Maurícias
68 para suprir o mercado interno e também externo (LIAO et al., 2016)

69 Segundo os dados de CROSETTI (2016) a produção de tainha vem crescendo na
70 área da pesca e aquicultura, de modo que teve um saldo mais visível a partir do ano 2000
71 com pico de produção em 2007, no ano de 2013 a produção mundial de Mugilídeos foi de
72 698.293 toneladas. Claramente a pesca contribuiu com maior quantidade de tainhas do
73 que a aquicultura (Figura III).

74

Fonte: Crosetti, 2016 (adaptado)

75 Figura III - Produção mundial de mugilídeos da pesca e da aquicultura em toneladas (1950-2013)
76 (CROSETTI, 2016).

77 O Brasil em 2013 era o quinto país que mais capturava tainhas, ficando atrás da
78 China, Indonésia, Índia e Egito (CROSETTI, 2016), mas ainda assim importou-se

79 aproximadamente 1,9 toneladas de tainhas congeladas no decorrente ano (SEBRAE,
80 2015). O consumo de pescado no país vem aumentando ano a ano, e tem sido observada a
81 redução do estoque natural de muitos peixes, como é o caso da tainha (LEMOS et al.,
82 2014). Dessa forma, para suprir o mercado consumidor se faz necessário buscar o
83 mercado externo, uma vez que o país ainda não tem produção comercial suficiente para
84 suprir a demanda existente.

85 As tainhas são consideradas um dos gêneros mais importantes para a pesca
86 marinha e estuarino-lagunares nacional, ficando na sétima colocação dos recursos
87 pesqueiros explorados tradicionalmente (NETO & DIAS, 2015), e são importantes
88 recursos para a subsistência das comunidades litorâneas do Brasil (MPA & MMA, 2015)

89 Dentre as espécies de Mugilídeos que ocorrem no país, a *M. liza* é considerada a
90 mais importante para as atividades pesqueiras, sendo responsável por 40-44% do
91 desembarque total de Mugilídeos entre o período de 1980 e 2010, sendo que 95% da
92 captura da espécie ocorre na região sul-sudeste (LEMOS et al., 2014). A média relativa
93 de captura da espécie por estado entre 1980 e 2010, teve Santa Catarina como maior
94 produtor (45%), seguido pelo Rio Grande do Sul (30%), Rio de Janeiro (17%), São Paulo
95 (8%), e Espírito Santo e Paraná juntos com cerca de 1% do total (MPA & MMA, 2015).
96 No estado de Santa Catarina foi declarado que a pesca artesanal da tainha integra o
97 patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado pela Lei Estadual nº 15.922/2012.

98 A carcaça da tainha é toda destinada para abastecimento do mercado interno, em
99 especial as comunidades litorâneas, e o contrário ocorre com as ovas e moelas, que são
100 destinadas quase em sua totalidade para o mercado externo (Taiwan, França, Grécia,
101 Itália e Espanha) (MPA & MMA, 2015). A retirada de ovas e moelas, que são
102 coprodutos, provenientes da frota de cerco é toda destinada às indústrias (LEMOS et al.,
103 2014). No ano de 2007 ocorreu o maior pico de produção com 600 t. de ovas de tainha
104 exportada, declinando para 180 t. em 2013 (MDIC, 2017). O direcionamento da frota de
105 cerco sobre a tainha ocorreu no início dos anos 2000, associado ao declínio das capturas
106 da sardinha-verdadeira, e que, mesmo com o início da recuperação do estoque da espécie
107 alvo, a continuidade do interesse deveu-se, principalmente, ao valor da exportação das
108 ovas, disputada pelo mercado internacional, como iguaria (MPA & MMA, 2015)

109 Apesar do potencial mercado em torno da espécie, o estoque natural está em
110 declínio. No ano de 2004, a espécie foi incluída na lista de animais em sobrepesca pelo

111 Ministério do Meio Ambiente (IN nº5 21/05/2004), e desde de 2007 a captura vem
112 apresentando uma redução gradativa nos números (MDIC, 2017). O período autorizado
113 para pesca de cerco é de maio a julho, no período de desova, pois as gônadas é o produto
114 principal do mercado, com isso o recrutamento da espécie está limitado (LEMOS et al.,
115 2014). Atualmente, o esforço de pesca é de 60 traineiras autorizadas, e segundo plano de
116 gestão para o uso sustentável da tainha *M. liza* no sudeste e sul do Brasil do ano de 2015,
117 esta quantidade de frota está acima do nível sustentável, e se nenhuma medida for tomada
118 a curto prazo, essa espécie entrará em extinção em poucos anos.

119 **CRIAÇÃO DE TAINHA**

120 A produção aquícola de tainha no mundo, nos últimos anos, vem crescendo
121 seguindo a tendência geral da aquicultura, com potencial de atender à crescente demanda
122 em contraponto ao declínio dos estoques pesqueiros (PAN et al., 2016).

123 Sua criação existe desde a época da civilização Romana, na região do
124 mediterrâneo, para subsistência (SADEK, 2016). Mas, foi depois do século XX que
125 atingiu nível comercial em lagos de águas interiores na região de Faium, no Egito, Mar
126 Negro e Mar Cáspio na Rússia e na Itália com o povoamento em águas vulcânicas.
127 Posteriormente vários outros países começaram a apostar na piscicultura de tainhas
128 (LEBER et al., 2016).

129 A FAO (2015) relatou registros da criação de tainhas em 15 países (Egito,
130 Indonésia, Coreia, Taiwan, Israel, Tunísia, Guiana, China, Iraque, Iraque, Arábia Saudita,
131 Cingapura, Grécia, Itália, Espanha e Ucrânia) no ano de 2013, com um total de produção
132 de 138.143 toneladas (Figura III). Deste total, o Egito participou com 84,1%, seguido da
133 Indonésia com 5,8%, Coreia 3,5 %, Taiwan 1,9%, Israel 1,6% e 3,1% os outros países.

134 O fato que contribuiu para que o Egito apresentasse a maior produção mundial foi
135 a decisão dos órgãos do governo em investir no povoamento de extensas áreas salinas
136 inutilizadas, no ano de 2003, uma vez que as tainhas toleram baixas temperaturas e águas
137 com salinidade entre 5 – 30 (SADEK, 2016). Desde então o crescimento da produção foi
138 exponencial, de modo que 74% do total de tainha produzido no país em 2013 advinham
139 da aquicultura (GONZÁLEZ-CASTRO & GHASEMZADEH, 2016)

140 Oficialmente são relatado dados de apenas três espécies são relatadas nos dados
141 oficiais: *Mugil cephalus*, *Liza haematocheila* e a *Mugil liza* sendo que aproximadamente

142 90% são declaradas como 'mullet nei' que inclui várias espécies de tainhas (CROSETTI,
143 2016).

144 A tainha possui várias características que são pertinentes para a criação tais como,
145 a capacidade de viver em diferentes habitats, incluindo quase todas as zonas costeiras
146 tropicais, subtropicais e temperadas (PAN et al., 2016), águas interiores e marinhas,
147 doces, salobras e salgadas (CROSETTI, 2016). Aceita alimentos artificiais (Pan et al.
148 2016), tem baixa exigência proteica (14-38%) e energética (2500 Kcal/Kg) (EL-
149 DAHHAR, 2006), mostrando-se viável na criação extensiva e semi-intensiva em tanques
150 rede (SALEH, 2008).

151 É um peixe que necessita fazer migração para reproduzir (LEMOS et al., 2014),
152 por isso em cativeiro não desovam espontaneamente e necessitam de tratamento
153 hormonal para maturação final e liberação dos ovócitos (SADEK, 2016). Há relatos de
154 ensaios de desova induzida em vários países como na Itália, Taiwan (LIAO et al., 2016),
155 Egito (SALEH, 2008; SADEK, 2016), Estados Unidos (LEBER et al., 2016), Cuba
156 (ALVAREZ-LAJONCHERE, 1988) e também no Brasil (ANDREATTA et al., 1983;
157 GODINHO et al., 1988). Mas apesar dessas ocorrências, as produções comerciais
158 existentes são abastecidas com larvas e juvenis do ambiente, deixando limitado o
159 desenvolvimento do setor e se tornando um problema ambiental, como já é relatado no
160 Egito, onde a demanda por juvenis para crescimento e engorda é maior que o estoque
161 autorizado para captura, e por isso muitos piscicultores usam meios clandestinos para
162 adquirir os peixes (SADEK, 2016)

163 Desde a década de 1980 pesquisadores já apontavam a criação de tainhas como
164 atividade promissora (NASH & SHEHADEH, 1980; OREN, 1981; ALVAREZ-
165 LAJONCHERE, 1988; GODINHO et al. 1988), mas nunca se atingiu o potencial
166 esperado com o decorrer dos anos e uma das razões é fato da aquicultura voltar seu
167 interesse e investimentos para outras espécies, mas principalmente pela dificuldade de
168 fechar seu ciclo de vida em cativeiro (CROSETTI, 2016).

169 Para a espécie *M. liza* vem sendo realizada várias pesquisas na área da nutrição
170 (ZAMORA-SILLERO et al., 2013; SILVA, 2010; RAMOS et al., 2015; ITO &
171 BARBOSA, 1997; CARVALHO et al., 2010), parâmetros físico-químicos (SAMPAIO et
172 al., 2002; OKAMOTO et al., 2006) e sistemas de criação (SAMPAIO, 2008; ROCHA,
173 2012; COSTA et al., 2013) foram desenvolvidas para promover sua criação no país,

174 podendo ser uma alternativa às carpas na região Sul devido às características já
175 apresentadas, mas principalmente a que se refere à amplitude térmica tolerada.

176 ***MORFOLOGIA DO TRATO***

177 Graças à elevada sofisticação do trato digestório, os Mugilídeos têm uma
178 estratégia peculiar para explorar um único nicho trófico que nenhum outro grupo
179 forrageiro possui para a captura e seleção do alimento (CARDONA, 2016). A boca é
180 terminal ou subterminal na maioria das espécies (MENEZES et al., 2015) com presença
181 de dentes pequenos no pré-maxilar e mandíbula para a raspagem de filmes microbianos,
182 e, além disso, possui dentes faringianos no palato que auxiliam na trituração e
183 reconhecimento do alimento (FAO, 1999). Possui rastros branquiais densos que retém as
184 partículas finas, sendo que o quinto arco branquial juntamente com a almofada faringiana
185 classificam e rejeitam partículas mais grosseiras presentes no sedimento.

186 O esôfago é relativamente curto e desemboca no estômago que é dividido em duas
187 porções: cárdica e pilórica. A primeira faz a digestão enzimática e a segunda, que
188 corresponde à moela, desempenha função estritamente mecânica na digestão e, apesar de
189 todas as tainhas apresentarem essas duas porções, a morfologia vai variar conforme a
190 espécie (NELSON, 2006). Os cecos pilóricos se localizam ao final da porção pilórica
191 variando meristicamente e numericamente (Figura IV) conforme o gênero e espécie
192 (CARDONA, 2016).

193

Fonte: Cardona, 2016 (adaptado).

195
196
197
198

Figura IV- Morfologia dos estômagos e diversidade de números de cecos nos diferentes gêneros. A- *Mugil Chepalus*; B- *Liza saliens*; C- *Liza aurata*; D- *Liza ramada*; E- *Chelon labrosus*.

199

200 O intestino, por sua vez, é disposto em várias espiras e seu comprimento, via de
201 regra, é sempre maior que o corpo (1,6 – 4,5 vezes), variando em função da espécie,
202 ambiente e alimento (CARDONA, 2016). Além disso, todo esse órgão é envolto em
203 tecido conjuntivo adiposo que atua como um armazenador de gordura (PILLAY, 1953;
204 CARDONA, 2016).

205 Com relação a *M. Liza*, Galvão et al., (1997) verificaram que o desenvolvimento
206 do sistema digestório é bastante lento, com o trato tubular e reto e sem glândulas gástricas
207 na fase larval, sendo, portanto, a digestão alcalina na qual a absorção de proteínas é
208 realizada por meio de pinocitose. Com três dias após a eclosão, tem se a abertura da boca
209 e do ânus e o aparecimento do fígado, vesícula biliar e pâncreas. As células gástricas
210 surgem só no 40º dia quando as áreas do estômago já estão distintas e a região pilórica
211 faz a digestão mecânica (sem glândulas gástricas) e as células caliciformes se apresentam
212 no 48º dia e aos 60 dias o trato estará completo.

213 ***PLASTICIDADE E RESPOSTA À DIETA***

214 O processo evolutivo proporcionou transformações e adaptações do sistema
215 digestório para que pudessem se adequar a ingestão, digestão e assimilação de nutrientes
216 fornecido pelo meio, adequando o hábito alimentar de cada espécie (OLSSON, 2011). No
217 tocante à flexibilidade fenotípica do trato gastro-intestinal (TGI) em resposta às
218 alterações na dieta, apesar de ocorrer nos diferentes hábitos alimentares, se destaca em
219 onívoros e herbívoros (BALDISSEROTTO, 2013).

220 As diferentes características morfológicas juntamente com os distintos hábitos
221 alimentares determinam que o TGI tem como principal função a digestão
222 (FRACALOSSO & CYRINO, 2012), de modo que, são encontrados mecanismos
223 digestivos de distintas formas (DABROWSKI & PORTELLA, 2005), na qual Wilson e
224 Castro (2010) classificaram em quatro principais tipos de digestão, sendo: Tipo I –
225 digestão com baixo pH gástrico, que faz a *lise* das paredes celulares, desnaturação das
226 proteínas e a ativação da pepsina iniciando a digestão enzimática dos alimentos; Tipo II –
227 digestão que envolve a trituração do alimento pelo estômago tipo moela, que age de
228 forma mecânica; Tipo III – a trituração de alimentos ocorre no aparelho faríngeo, com um
229 moinho faríngeo bem desenvolvido, o estômago está completamente ausente e o alimento
230 finamente moído é passado diretamente para o intestino e; Tipo IV – em que a
231 fermentação microbiana é utilizada por alguns peixes herbívoros para produzir ácidos
232 graxos de cadeia curta.

233 Nos mugilídeos a digestão ocorre por meio químico e mecânico (digestão tipo II)
234 semelhante às aves, em que o alimento passa primeiramente pela cárdia e o suco gástrico
235 decompõe parcialmente os alimentos, tornando-os mais macios, facilitando assim a
236 trituração na porção subsequente (piloro) com auxílio de areia (WILSON & CASTRO,
237 2010). Apesar de haver produção de enzimas digestivas no estômago, de modo geral,
238 vários autores reportam que esta tem sua digestão alcalina (PAYNE, 1978; WILSON &
239 CASTRO, 2010; CARDONA, 2016).

240 A característica mais evidente de modulação morfofisiológica em peixes é a
241 variação do comprimento do trato gastrointestinal (FRACALOSSO & CYRINO, 2012). A
242 plasticidade intestinal é um mecanismo apresentado por esses indivíduos frente à
243 diversificada alimentação para adequar o trato a fim de obter uma melhor absorção
244 (DABROWSKI & PORTELLA, 2005). Deste modo, os herbívoros são considerados

245 mais aptos à flexibilidade adaptativa do trato digestório por terem uma dieta bastante
246 variável, ao contrário dos carnívoros que tem uma alimentação mais restrita e uma menor
247 capacidade de modulação (BALDISSEROTTO, 2013).

248 Neste contexto, as tainhas apresentam, por via de regra, um longo intestino, que
249 varia entre as espécies e entre os indivíduos de uma mesma espécie em diferentes fases e
250 habitats (PILLAY, 1953; EGGOLD & MOTTA, 1992; ROSELET, 2005), refletindo as
251 diferenças na capacidade de assimilar o material vegetal (CARDONA, 2016). Na
252 literatura são relatados valores para a relação comprimento do intestino/comprimento do
253 corpo entre 1,5 para espécie *Liza saliens* até 5,5 para *Mugil cephalus* (ODUM, 1970;
254 DRAKE & ARIAS, 1984), e já para a *M. liza* foi reportado o valor de 3,1 para espécimes
255 adultas e de 1,6 a 2,1 para juvenis (ROSELET, 2005).

256 De maneira geral, os peixes teleósteos possuem basicamente dois segmentos
257 intestinais, o qual na primeira porção é realizada a absorção dos micronutrientes
258 (monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos) e na segunda porção a entrada de
259 macromoléculas por pinocitose (WILSON & CASTRO, 2010). O transporte transepitelial
260 intestinal dos nutrientes utiliza mecanismos especializados para absorção conforme o
261 hábito alimentar. Por exemplo, os herbívoros e os detritívoros com dietas que contém
262 mais carboidratos apresentam um trânsito mais rápido do alimento e alongamento
263 intestinal, já os carnívoros que possuem um aporte maior de proteínas na sua dieta, tem
264 um aumento na área de absorção e um trânsito mais lento (BALDISSEROTTO, 2013).

265 As proteínas e os aminoácidos são absorvidos na membrana apical dos enterócitos
266 através de simportes aminoácidos/Na⁺ e por difusão, enquanto os carboidratos são
267 absorvidos na forma de monossacarídeos em processo semelhante dos aminoácidos, na
268 qual a glicose e a galactose entram nos enterócitos por meio de simporte com o Na⁺, e a
269 frutose por difusão facilitada (WILSON & CASTRO, 2010).

270 Outra adaptação evolutiva dos peixes, sobretudo os que se alimentam
271 principalmente de vegetais, é a presença numerosa de células caliciformes no trato, em
272 que o muco altamente viscoso por elas produzido, absorve água e nutrientes nela
273 solúveis. O gel formado se mistura ao alimento durante o transporte faríngeo até as
274 porções onde os processos digestivo e absorptivo atuam sobre os nutrientes mantidos
275 dentro da matriz mucosa (DABROWSKI & PORTELLA, 2005). E no que se refere aos
276 mugilídeos, no estômago encontra-se muco constituído de mucopolissacarídeos neutros

277 para proteger o epitélio da abrasão e facilitar a ação enzimática (CASTRO et al., 1961).
278 Já nos cecos e intestino proximal, os quais são regiões de maior fluxo de absorção dos
279 nutrientes, estão distribuídas um maior número de células (GALVÃO et al., 1997)

OBJETIVOS

280 ***OBJETIVO GERAL***

281

282 A presente dissertação tem como objetivo geral avaliar as alterações
283 morfofisiológicas do trato digestório da *Mugil liza* Valenciennes, 1836, de ambiente e
284 confinamento.

285 ***OBJETIVOS ESPECÍFICOS***

286 ➤ Avaliar o peso, comprimento total e comprimento do intestino de
287 ambiente e confinamento.

288 ➤ Avaliar o peso do estômago e do conteúdo estomacal de tainhas de
289 ambiente e confinamento.

290 ➤ Aferir o pH das porções do estômago (cárdia e piloro), cecos pilóricos e
291 intestino (proximal, médio e distal) dos indivíduos.

292 ➤ Caracterizar histologicamente a porção dos cecos pilóricos da *M. liza*.

293 ➤ Quantificar a distribuição das células caliciformes nas porções do cecos e
294 intestino da *M. liza*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 295 ALVAREZ-LAJONCHERE, L. Positive results of induced spawning and larval rearing
296 experiments with *Mugil liza* Val ., a grey mullet from Cuban waters. **Aquaculture**,
297 v. 73, n. August, p. 349–355, 1988.
- 298 BALDISSEROTTO, B. **Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura**, 3 edição. ed.
299 editoraufsm, Samta Maria, 2013.
- 300 BARLETTA, M., DANTAS, D. V. Biogeography and Distribution of Mugilidae in the
301 Americas 2016.
- 302 BUDDINGTON, R. K., DOROSHOV, S. I. Structural and Functional Relations of the
303 White Sturgeon Alimentary Canal (*Acipenser transmontanus*). **Journal of**
304 **Morphology**, v. 190, , p. 201–213, 1986.
- 305 CARDONA, L. Food and Feeding of Mugilidae, In: Biology, Ecology and Culture of
306 Grey Mullet (Mugilidae). pp. 165–195 2016.
- 307 CARVALHO, C. V. A. De, BIANCHINI, A., TESSER, M. B., SAMPAIO, L. A. The
308 effect of protein levels on growth , postprandial excretion and tryptic activity of
309 juvenile mullet *Mugil platanus* (Günther). **Aquaculture Research**, v. 41, , p. 511–
310 518, 2010.
- 311 CASTRO, N. M., SASSO, W. S., KATCHBURIAN, E. A histological and histochemical
312 study of the *Mugil* sp. pisces (tainha). **Acta Anatomica**, v. 45, , p. 155–163, 1961.
- 313 COSTA, L. C. de O., XAVIER, J. A. A., NEVES, L. F. de M., AZAMBUJA, A. M. V.
314 de, WASIELESKY JUNIOR, W., FIGUEIREDO, M. R. C. Polyculture of
315 *Litopenaeus vannamei* shrimp and *Mugil platanus* mullet in earthen ponds. **Revista**
316 **Brasileira de Zootecnia**, v. 42, n. 9, p. 605–611, 2013.
- 317 CROSETTI, D. Current State of Grey Mullet Fisheries and Culture, In: CROSETTI, D
318 (Ed.), Biology, Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae). New York, pp.
319 398–350 2016.
- 320 DABROWSKI, K., PORTELLA, M. C. Feeding Plasticity and Nutritional Physiology in
321 Tropical Fishes, In: Fish Physiology. pp. 155–224 2005.
- 322 DÍAZ, A. O., GARCÍA, A. M., GOLDEMBERG, A. L. Glycoconjugates in the mucosa
323 of the digestive tract of *Cynoscion guatucupa*: A histochemical study. **Acta**
324 **Histochemica**, v. 110, n. 1, p. 76–85, 2008.

- 325 DRAKE, P., ARIAS, A. M. Biología de los Múgildeos (Osteichthyes, Mugilidae) en los
326 esteros de las alinas de San Fernando (Cádiz). III. Hábitos alimentarios y su relación
327 con la morfometría del aparato digestivo. **Inv. Pesq.**, v. 48, n. 2, p. 337–367, 1984.
- 328 EL-DAHAR, A. A. Review article on Mullet larval Acclimatization and Determination
329 of their nutritional requirements in Egypt. **JOURNAL OF THE ARABIAN**
330 **AQUACULTURE SOCIETY**, v. 1, n. 2, p. 19–43, 2006.
- 331 FAO, F. A. A. O. O. T. U. N. Order MUGILIFORMES MUGILIDAE, In:
332 CARPENTER, K., VH NIEM (Eds.), FAO Species Identification Guide for Fishery
333 Purposes. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Volume 4.
334 Bony Fishes Part 2 (Mugilidae to Carangidae). Rome, pp. 2069–2083 1999.
- 335 FISCHER, L. G., PEREIRA, L. E. D., VIEIRA, J. P. **PEIXES ESTUARINOS E**
336 **COSTEIROS** 2011.
- 337 FRACALOSI, D. M., CYRINO, J. E. P. **Nutriaqua: nutrição e alimentação de**
338 **especies de interesse para aquicultura brasileira**. Florianópolis, SC, 2012.
- 339 GALVÃO, M. S. N., FENERICH-VERANI, N., YAMANAKA, N., OLIVEIRA, I. R.
340 Histologia do sistema digestivo da tainha *Mugil platanus* Günther, 1880
341 (Osteichthyes, Mugilidae) durante as fases larval e juvenil. **Boletim do Instituto de**
342 **Pesca**, v. 24, , p. 91–100, 1997.
- 343 GONZÁLEZ-CASTRO, M., GHASEMZADEH, J. Morphology and Morphometry Based
344 Taxonomy of Mugilidae, In: CROSETTI, D, S BLABER (Eds.), *Biology, Ecology*
345 *and Culture of Grey Mullet (Mugilidae)*. Taylor and Francis Group, New York, pp.
346 1–21 2016.
- 347 GONZÁLEZ-CASTRO, M., MINOS, G. Sexuality and Reproduction of Mugilidae, In:
348 *Biology, Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae)*. pp. 227–263 2016.
- 349 GUPTA, S. B. C. Food and Feeding Habits and Physiology of Digestion in. Certain
350 Riverine Teleosts. **Proceedings of the Indian National Science Academy**, v. 6, , p.
351 837–844, 1981.
- 352 INAMI, M., TAVERNE-THIELE, A. J., SCHRØDER, M. B., KIRON, V., ROMBOUT,
353 J. H. W. M. Immunological differences in intestine and rectum of Atlantic cod
354 (*Gadus morhua* L.). **Fish & Shellfish Immunology**, v. 26, n. 5, p. 751–759, 2009.
- 355 ITO, K., BARBOSA, J. C. Nivel protéico e proporção de proteína de origem animal em
356 dietas artificiais para a tainha, *Mugil platanus*. **Instituto de Pesca**, v. 24, n. (único),

357 p. 111–117, 1997.

358 JUTFELT, F. INTEGRATED FUNCTION AND CONTROL OF THE GUT | Barrier
359 Function of the Gut, In: Encyclopedia of Fish Physiology. Elsevier, pp. 1322–1331
360 2011.

361 LEBER, K. M., LEE, C., BRENNAN, N. P., ARCE, S. M., TAMARU, C. S.,
362 BLANKENSHIP, H. L., NISHIMOTO, T. Stock Enhancement of Mugilidae in
363 Hawaii (USA). **Biology, Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae)**, p.
364 467–486, 2016.

365 LEIV LEKNES, I. Histochemical studies on mucin-rich cells in the digestive tract of a
366 teleost, the Buenos Aires tetra (*Hyphessobrycon anisitsi*). **Acta Histochemica**, v.
367 113, n. 3, p. 353–357, 2011.

368 LEMOS, V. M., JR, A. S. V., SCHWINGEL, P. R., MUELBERT, J. H. Migration and
369 reproductive biology of *Mugil liza* (Teleostei : Mugilidae) in south Brazil p. 671–
370 687, 2014.

371 LIAO, I. C., CHAO, N. H., TSENG, C. C. Capture and Culture of Mugilidae in Taiwan,
372 In: *Biology, Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae)*. New York, pp. 487–
373 500 2016.

374 MCCAULEY, H. A., GUASCH, G. Three cheers for the goblet cell: maintaining
375 homeostasis in mucosal epithelia. **Trends in Molecular Medicine**, v. 21, n. 8, p.
376 492–503, 2015.

377 MENEZES, N. A., NIRCHIO, M., DE OLIVEIRA, C., SICCHARAMIREZ, R.
378 Taxonomic review of the species of *Mugil* (Teleostei: Perciformes: Mugilidae) from
379 the Atlantic South Caribbean and South America, with integration of morphological,
380 cytogenetic and molecular data. **Zootaxa**, v. 3918, n. 1, p. 1–38, 2015.

381 MENEZES, N. A., OLIVEIRA, C., NIRCHIO, M. An Old Taxonomic Dilemma : The
382 Identity Of The Western South Atlantic Lebranche Mullet (Teleostei : Perciformes :
383 Muglidae). **Zootaxa**, v. 2519, , p. 59–68, 2010.

384 MPA, M. da P. e A., MMA, M. do M. A. **PLANO DE GESTÃO PARA O USO**
385 **SUSTENTÁVEL DA TAINHA, *Mugil liza* Valenciennes, 1836, NO SUDESTE**
386 **E SUL DO BRASIL.** 2015.

387 NELSON, J. S. **Fishes of the World**, 4th ed 2006.

388 NETO, J. D., DIAS, J. de F. O. **O USO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA NO**

- 389 **BRASIL: UMA AVALIAÇÃO COM FOCO NA PESCA (IBAMA)**. Brasília-
390 DF, 2015.
- 391 ODUM, W. E. Utilization of the direct grazing and plant detritus food chains by the
392 striped mullet *Mugil cephalus*., In: STEELE, JH (Ed.), *Marine Food Chains*. Oliver
393 & Boyd, London, pp. 220–240 1970.
- 394 OKAMOTO, M. H., SAMPAIO, L. A., MAÇADA, A. P. EFEITO DA
395 TEMPERATURA SOBRE O CRESCIMENTO E A SOBREVIVÊNCIA DE
396 JUVENIS DA TAINHA *Mugil platanus* GÜNTHER , 1880. *Atlântica*, v. 28, n. 1,
397 p. 61–66, 2006.
- 398 OLIVEIRA, I. R., SOARES, L. S. H. Alimentação da Tainha *Mugil platanus* Günter,
399 1880 (Pisces: Mugilidae), da Região Estuarino-Lagnar de Canaéia, São Paulo,
400 Brasil. **Boletim do Instituto de Pesca**, v. 23, , p. 95–104, 1996.
- 401 OLIVEIRA, A. F. De, BEMVENUTI, M. D. A. O CICLO DE VIDA DE ALGUNS
402 PEIXES DO ESTUÁRIO DA LAGOA DOS PATOS , RS , INFORMAÇÕES
403 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. **Cadernos de Ecologia Aquática**,
404 v. 1, n. 2, p. 16–29, 2006.
- 405 OLSSON, C. GUT ANATOMY AND MORPHOLOGY | Gut Anatomy, In:
406 *Encyclopedia of Fish Physiology*. Elsevier, pp. 1268–1275 2011.
- 407 PALANISAMY, K. Studies on the digestive enzymes of the cultivable grey mullet *Liza*
408 *parsia* (Hamilton Buchanan, 1822). Cochin University of the and tecnology 1989.
- 409 PAN, J., ALIAUME, C., ANASTASOPOULOU, A., BERREBI, P., CASELLAS, C.,
410 CHANG, C., DIOUF, P. S., DURAND, J., HERNANDEZ, F., LEÓN, F. J. G. De,
411 LALÈYÈ, P., MORALES-NIN, B., MIRANDA, J. R. Grey Mullet as Possible
412 Indicator of Coastal Environmental Changes : the MUGIL Project, In: *Biology,*
413 *Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae)*. pp. 514–521 2016.
- 414 PILLAY, T. V. R. Studies on the food, feeding habits and alimentary tract of the grey
415 mullet *Mugil tade* Forskal. **Proceedings of the National Institut of Sciences of**
416 **India**, 1953.
- 417 RAMOS, L. R. V., ROMANO, L. A., MONSERRAT, J. M., ABREU, P. C., VERDE, P.
418 E., TESSER, M. B. Biological responses in mullet *Mugil liza* juveniles fed with guar
419 gum supplemented diets. **Animal Feed Science and Technology**, v. 205, , p. 98–
420 106, 2015.

- 421 ROCHA, A. F. Avaliação do Pontecial da Criação de Juvenis de Tainhas *Mugil cf. hopens*
422 e *Mugil liza* em Sistema de Bioflocos. Universidade Federal do Rio Grande 2012.
- 423 ROSELET, F. F. G. Considerações ecológicas sobre o habito alimentar iliógago dos
424 juvenis da tainha *Mugil platanus* Günther, 1880 no estuário da lagoa dos patos e
425 região costeira adjacente, RS - Brasil. Fundação Universidade Federal do Rio
426 Grande 2005.
- 427 ROSS, M. H., PAWLINA, W. **Histologia Texto e Atlas: Correlação com Biologia**
428 **Celular e Molecolar**, 7th ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2016.
- 429 ROSSI, A. R., CROSETTI, D., LIVI, S. Genetics of Mugilidae, In: Biology, Ecology and
430 Culture of Grey Mullet (Mugilidae). New York, pp. 350–397 2016.
- 431 SADEK, S. Culture of Mugilidae in Egypt, In: CROSETTI, D, S BLABER (Eds.),
432 Biology, Ecology and Culture of Grey Mullet (Mugilidae). New York, pp. 501–513
433 2016.
- 434 SALEH, M. Capture-based aquaculture of mullets in Egypt. **Capture-based**
435 **aquaculture. Global overview FAO Fisheries Technical Paper. No. 508**, p. 109–
436 126, 2008.
- 437 SAMPAIO, J. A. de O. Desempenho de linguados *Paralichthys orbignyanus* em
438 policultivo com tainhas *Mugil platanus* em viveiros de solo, no período de outono e
439 inverno. Fundação Universidade Federal de Rio Grande 2008.
- 440 SAMPAIO, L. A., FERREIRA, A. H., TESSER, M. B. Effect of stocking density on
441 laboratory rearing of mullet fingerlings, *Mugil platanus* (Günther, 1880). **Acta**
442 **Scientiarum**, v. 23, n. 2, p. 471–475, 2001.
- 443 SEBRAE, S. B. de A. às M. e P. E. **AQUICULTURA DO BRASIL Série Estudos**
444 **Mercadológicos** 2015.
- 445 SILVA, E. M. Efeitos da restrição alimentar sobre o crescimento, a utilização do alimento
446 e custo da alimentação de juvenis da tainha *Mugil platanus* Günther, 1880.
447 Universidade Federal do Rio Grande 2010.
- 448 THOMSON, B. J. M. The organs of feeding and the food of some Australian mullet.
449 **Aust. J. Mar. Freshw. Res**, v. 5, , p. 469–485, 1954.
- 450 VAN DER MAREL, M., PRÖPSTING, M. J., BATTERMANN, F., JUNG-SCHROERS,
451 V., HÜBNER, A., ROMBOUT, J. H. W. M., STEINHAGEN, D. Differences
452 between intestinal segments and soybean meal-induced changes in intestinal mucus

453 composition of common carp *Cyprinus carpio* L. **Aquaculture Nutrition**, v. 20, n.
454 1, p. 12–24, 2014.

455 WILSON, J. M., CASTRO, L. F. C. Morphological diversity of the gastrointestinal tract
456 in fishes, In: *Fish Physiology*. Elsevier Inc., pp. 1–55 2010.

457 ZAMORA-SILLERO, J., RAMOS, L. R. V, ROMANO, L. A., MONSERRAT, J. M.,
458 TESSER, M. B. Effect of dietary dextrin levels on the growth performance, blood
459 chemistry, body composition, hepatic triglycerides and glycogen of Lebranche mullet
460 juveniles (*Mugil liza* Valenciennes 1836, Mugilidae). **Journal of Applied**
461 **Ichthyology**, v. 29, n. 6, p. 1342–1347, 2013.

462

CAPITULO ÚNICO: Artigo científico da presente dissertação para submissão em periódico internacional.

Diferenças morfofisiológicas do trato gastrointestinal de tainhas *Mugil liza* provenientes de criação e do ambiente

Correspondencia: D L Costa, Laboratório de Piscicultura Estuarina e Marinha, Programa de Pós-graduação em Aquicultura, Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Oceanografia, Rio Grande, RS, CEP 96210-030, Brazil. E-mail: dn.medici@gmail.com

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition

Observação: Tabelas e figuras foram incluídas no corpo do texto para facilitar a leitura da dissertação.

Resumo

A tainha apresenta um trato gastrointestinal sofisticado, o que lhe permite aproveitar alimentos nutricionalmente pobres. Devido ao trato ser modulado pelos diferentes tipos de alimentos disponíveis no meio, o objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações morfofisiológicas do trato digestório de tainhas, *Mugil liza*, provenientes de diferentes ambientes. Foram utilizados 20 exemplares de *M. liza*, sendo cinco provenientes da praia do Cassino (PC), 10 da Lagoa dos Patos (LP). Destes, cinco foram mantidos por 147 dias em sistema de recirculação (LP-RAS) e cinco em de tanque rede por x dias (RAS-TR). Os organismos da LP-RAS foram alimentados duas vezes ao dia com ração comercial com 38% de PB e os de RAS-TR com 42% de PB. Todas as tainhas foram eutanasiadas com benzocaína (500 mg/L) e logo após os organismos da PC, LP e RAS-TR foram transportados até o laboratório em isopor com água+gelo (temperatura <4°C). Foram analisados o peso, comprimento total, quociente intestinal (QI), índice estomacal (IE), índice de conteúdo estomacal (ICE), pH do trato e distribuição de células caliciformes nos cecos e intestino. Os exemplares do ambiente apresentaram um QI, IE e ICE estatisticamente maior que o de cativeiro. O pH estomacal dos peixes RAS-TR foi mais ácido em relação aos da PC, sendo que os tratamentos LP e LP-RAS permaneceram em uma condição intermediária. A partir dos cecos não houve diferença no pH entre as diferentes origens, exceto no intestino médio. Foi verificado maior número de células caliciformes no intestino distal e cecos pilóricos, seguido do intestino proximal e intestino médio. Os dados sugerem que as alterações morfofisiológicas são adaptações moduladas pelo grau de facilidade de digestão e absorção dos nutrientes que cada alimento contém devido a sua composição, de modo que as rações por serem assimiladas mais rápido, tendem a reduzir o peso do estômago e a área de absorção do intestino. Além disso, acredita-se que a presença de alimentos mais proteicos aumenta a liberação de suco gástrico reduzindo o pH estomacal. O maior número de células caliciformes foi verificado justamente nos locais onde há necessidade de aumentar a absorção, lubrificação e proteção do epitélio

Palavras chaves: plasticidade, confinamento, fisiologia, moela, morfologia, Mugilídeos

Abstract

Morphophysiological differences of the gastrointestinal tract of grey mullet, *Mugil liza*, from confinement and environment

Grey mullet has a sophisticated gastrointestinal tract that allows the use of nutritionally poor foods. Due to the tract to be modulated by available food types in the environment, the goal of this study was to evaluate the morphophysiological changes in grey mullet, *Mugil liza* from different environments. It was used 20 individuals of *M. liza*, being 5 from Cassino beach (PC), 10 from Patos Lagoon (LP), from which 5 were reared in a recirculating aquaculture system (LP-RAS) and others 5 from RAS and reared in cages (RAS-TR). Fish of the LP-RAS and RAS-TR were fed twice a day on a commercial food with 38 and 42% of crude protein, respectively. All grey mullets were euthanized with benzocaine (500mg/L) and the fish from PC, LP and RAS-TQ were carried to the laboratory in a styrofoam box with water+ice (temperature <4°C). It was analyzed the weight, total length, intestinal quotient (QI), stomach index (IE), stomach content index (ICE), pH of different sections of the tract and goblet cells distribution on mucosal surface of the pyloric ceca and intestine. Grey mullets from environment showed a higher QI, IE and ICE than those from captivity. Stomach pH of fish from RAS-TR was more acid in relation to PC, being that fish from LP and LP-RAS were intermediary. The pH from pyloric ceca until distal intestine did not change among origins, except in the mid intestine. It was verified a higher number of goblet cells in the distal intestine and pyloric ceca, following by proximal and mid intestine. Data suggest that morphophysiological changes are adaptations modulated by the easiness degree of the nutrient digestion and absorption that each food has due to own composition, so that the weight of the stomach and the absorption area of intestine trend to decrease. Moreover, it is believed that more protein food increase the release of gastric juice, decreasing the stomach pH. In relation to goblet cells, it was verified a higher number precisely in places where it was necessary increasing the absorption, lubrication and protection of the epithelium.

Keywords: Plasticity, confinement, physiology, gizzard, morphometry, Mugilidae

Introdução

1 Dentre os Mugilídeos encontrados no litoral brasileiro, a tainha *Mugil liza*
2 apresenta-se como uma espécie com potencial para a criação, tanto pelo apelo econômico
3 em virtude da comercialização de suas ovas (Lemos et al., 2014; Menezes et al., 2015),
4 quanto por tolerar grandes variações dos parâmetros físicos e químicos da água (Sampaio
5 et al., 2002; Okamoto et al., 2006).

6 A *M. liza* é um organismo altamente oportunista e de distribuição na região
7 costeira da América do Sul até a ilhas caribenhas que habitam distintos habitats costeiros
8 (Menezes et al., 2010). O aparelho de alimentação é extremamente sofisticado, com uma
9 fisiologia flexível, que permite aos mesmos a exploração eficiente de um nicho trófico
10 que outros peixes não conseguem (Oliveira & Soares, 1996; Cardona, 2016). Alimentam-
11 se de detrito com um maior ou menor grau de seleção de partículas, o que confere
12 diferentes características à sua dieta (Roselet, 2005).

13 A *M. liza* faz parte das poucas espécies de peixes iliófagos (Oliveira et al., 1996),
14 os quais geralmente necessitam de adaptações morfológicas, comportamentais
15 alimentares e digestivas para extrair energia de algo que se presumia não possuir valor
16 nutricional (Dabrowski et al., 2005). Por isso, é devido aos diferentes hábitos alimentares
17 que o trato gastrointestinal (TGI) das espécies de peixes apresentam tantas diferenças
18 morfológicas e fisiológicas (Baldisserotto, 2013). No entanto, mesmo em indivíduos da
19 mesma espécie, ocorrem mudanças na morfometria do trato em resposta às alterações na
20 composição da dieta (Olsson et al., 2007; German et al., 2010).

21 Do ponto de vista evolutivo das tainhas, segundo Palanisamy (1989) elas possuem
22 pelo menos duas estratégias digestivas para poder explorar alimentos de difícil digestão
23 que são: aumentar o tempo de retenção de alimentos e aumentar a área de absorção com
24 um intestino alongado e a presença de cecos pilóricos e/ou modificar o tipo e de suas
25 enzimas digestivas.

26 Nesse sentido, considerando que no ambiente natural os indivíduos dispõem de
27 um espectro maior de itens alimentares, a morfologia de seus tratos digestórios se
28 apresenta na forma mais desenvolvida (German et al., 2010). Em contrapartida, quando
29 confinados e sujeitos a uma alimentação concentrada, pode ocorrer ou não um rearranjo.

30 O conhecimento das características do TGI, peculiares à espécie, colabora com o
31 desenvolvimento de manejos alimentares específicos (Fracalossi et al., 2012),

32 principalmente no que se refere à escolha de ingredientes para a composição da dieta,
33 frequência alimentar e tamanho de partícula (Petkam et al., 2001; Gaylord et al., 2008;
34 Webb et al., 2010).

35 Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis alterações
36 morfofisiológicas em tainhas (*M. liza*) provenientes do ambiente e mantidas em sistema
37 de recirculação de água e provenientes de reprodução artificial induzida e mantidas em
38 tanque rede.

Materiais e métodos

39 A captura dos exemplares na natureza foi autorizada pelo Ministério do Meio
40 Ambiente (SISBIO nº 57727-1) e todos os procedimentos foram aprovados pela
41 Comissão de Ética de Uso Animal- CEUA, sendo registrado com nº P010/2017.

42 Todas as análises foram realizadas na Estação Marinha de Aquicultura (EMA) do
43 Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (IO - FURG)
44 utilizando-se da estrutura do Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos
45 (LANOA) para as análises morfométricas e de pH e do Laboratório de Imunologia e
46 Patologia de Organismos Aquáticos (LIPOA) para as análises histológicas.

Animais utilizados e suas origens

48 Foram utilizados 20 exemplares de *M. liza*, sendo 5 provenientes da praia do
49 Cassino, 10 da Lagoa dos Patos e 5 do Laboratório de Piscicultura Marinha da
50 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC; Florianópolis – SC).

51 Os animais capturados na praia do Cassino foram imediatamente eutanasiados
52 com benzocaína (500 mg/L) e transportados até o laboratório em isopor com gelo
53 (temperatura <4°C) da mesma forma que metade dos provenientes da Lagoa dos Patos. Já
54 os cinco restantes foram mantidos em sistema de recirculação (RAS) de água por 147
55 dias.

56 Os exemplares adquiridos da Universidade Federal de Santa Catarina e mantidos
57 em sistema de recirculação de água até serem transferidos para tanques rede de 1m³
58 sitiados em um canal de abastecimento de uma fazenda de criação de camarões no
59 município de São José do Norte, onde, após 54 dias, foram eutanasiados e transportados
60 até o laboratório como descrito para os peixes do cassino.

61 Dessa forma, os animais tiveram as seguintes origens: PC: capturados na Praia do
62 Cassino; LP: capturados na Lagoa dos Patos; LP-RAS: capturados na Lagoa dos Patos e

63 criadas em sistema de recirculação de água; RAS-TR: mantidos em tanque rede após um
64 período em sistema de recirculação de água.

65 Os peixes da LP-RAS e RAS-TR foram alimentados duas vezes ao dia com uma
66 ração comercial de 38% de proteína bruta

67 *Dissecação e aferições*

68 Chegando ao laboratório, os animais foram retirados um a um do gelo, pesados,
69 medidos (comprimento total; CT) e tiveram seu TGI dissecado através de uma incisão
70 longitudinal na região ventral. Após o desenovelamento do TGI, o estômago e o intestino
71 foram separados, sendo que o primeiro foi pesado cheio e vazio (apenas para PC e RAS-
72 TR) e o segundo foi aferido o comprimento. Em seguida procedeu-se a secção do TGI em
73 seis partes, quais sejam: cárdia, piloro, cecos pilóricos, intestino proximal, intestino
74 médio e intestino distal para aferir o pH. Todos os procedimentos de dissecação foram
75 realizados sobre placas de vidro mantidas sobre bolsas térmicas com material congelado
76 (gelo em gel).

77 Foram pesados os conteúdos estomacais apenas dos exemplares do PC e RAS-TR.
78 Os exemplares de origem LP-RAS passaram por um período de 30 h de jejum anterior às
79 análises, de modo que impossibilitou ter os dados do peso do conteúdo os mesmos.

80 *Morfometria*

81 A partir dos dados de peso (P, g), comprimento total (CT, cm), comprimento do
82 intestino (CI, cm), peso do estômago (PE, g) e peso do conteúdo estomacal (PCE, g)
83 foram calculados:

84 Quociente intestinal, $QI = CI/CT$;

85 Índice estomacal, $IE (\%) = 100 \times PE/P$;

86 Índice do conteúdo estomacal, $ICE (\%) = 100 \times PCE/P$

87

88 *Análise de pH*

89 O pH foi aferido com pHmetro digital (YSI 100) utilizando-se de um eletrodo
90 Hanna® o qual foi mantido em contato com a superfície interna da porção avaliada até a
91 estabilização. No intestino as leituras foram realizadas nas extremidades iniciais de cada
92 porção.

93 Após a aferição do pH, as amostras do TGI (estômago, cecos pilóricos e intestino)
94 foram, identificadas e emergidas em solução de formaldeído tamponado 20%.

95 *Análises histológicas*

96 As amostras colhidas foram processadas em processador automático (PT05
97 Lupetec, Brasil), emblocadas em Paraplast®, cortadas em uma espessura de 5µm
98 (micrótomo MRP03 Lupetec, Brasil) e coradas com ácido periódico de Schiff (PAS) ou
99 Alcian Blue para a determinação de mucopolissacarídeos neutros e ácidos,
100 respectivamente. Para análise das células caliciformes foi utilizado o microscópio
101 Axioplan Zeiss e a avaliação visual de distribuição foram feitas com um aumento de
102 400×.

103

104 *Análises estatísticas*

105 Os dados foram analisados quanto a sua normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e
106 a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. Em seguida procedeu-se a análise
107 de variância (one way ANOVA) e a comparação de médias de mesmo peso pelo teste *t* de
108 Student, sendo que considerou-se o nível de significância de 5%. Além disso, testes de
109 correlação de Pearson foram realizadas entre algumas variáveis quando julgado
110 necessário. Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS 8.0
111 for Windows.

112

Resultados

113 *Morfometria*

114 Na Tabela 1 são apresentados os dados morfométricos avaliados nas tainhas das
115 diferentes origens. Os exemplares provenientes da LP e LP-RAS apresentaram peso e CT
116 superiores aos demais ($P<0,05$) e, por isso, as comparações foram realizadas entre os
117 grupos de peso semelhante. A manutenção dos peixes da LP em sistema de recirculação
118 (LP-RAS), causou uma redução de 45,2% no IE, 25,4% no CI e 26,7% no QI. Já os
119 valores de CI e QI dos peixes da PC foram superiores aos dos RAS-TR ($P<0,05$).

120

121 Tabela 1. Peso, comprimento total (CT), comprimento do intestino (CI), quociente
 122 intestinal (QI), índice estomacal (IE) e índice do conteúdo estomacal (ICE) de tainhas
 123 (*Mugil liza*) de diferentes origens.

Origem§	Peso (g)	CT (cm)	IE (%)	ICE (%)	CI (cm)	QI
PC	173,38 ± 54,40	26,03 ± 3,00	2,57 ± 0,30a	0,95 ± 0,17a	109,45 ± 8,84a	4,03 ± 0,39a
RAS-TR	202,00 ± 35,40	27,41 ± 1,51	1,07 ± 0,30b	0,52 ± 0,13b	77,13 ± 7,86b	2,82 ± 0,28b
LP	599,57 ± 91,58	40,69 ± 2,12	2,08 ± 0,32A	-	131,51 ± 22,76A	3,29 ± 0,68A
LP-RAS	692,62 ± 65,00	40,64 ± 1,47	1,14 ± 0,26B	-	98,12 ± 17,30B	2,41 ± 0,38B

124 § PC: Praia do Cassino; LP: Lagoa dos Patos; LP-RAS: Lagoa dos Patos e mantidos por 147 dias em
 125 sistema de recirculação de água; RAS-TR: Sistema de recirculação de água e mantidos por 54 dias em
 126 tanque rede. Nota: Colunas com letras minúsculas e maiúsculas indicam comparação dentro das menores e
 127 maiores faixas de peso, respectivamente, pelo teste *t* de Student. Em todos os casos considerou-se $P < 0,05$;
 128 Dados apresentados como média ± SD; $n=5$

129

130 Os indivíduos das diferentes origens entre as duas classes de peso apresentaram
 131 diferença estatística no IE dos organismos provenientes do ambiente (PC e LP) os quais
 132 possuíam estômagos com maior peso relativo em comparação aos de criação (LP-RAS e
 133 RAS-TR) ($P < 0,05$).

134 Os indivíduos capturados na PC apresentaram maior quantidade de alimento no
 135 estômago (expresso como ICE) em comparação aos do RAS-TR ($P < 0,05$). Além disso,
 136 os valores de ICE e IE das tainhas dessas origens mostraram correlação positiva ($r^2=0,82$;
 137 $P=0,013$).

138 *pH gastrointestinal*

139 A porção da cárdia do estômago dos peixes de origem RAS-TR apresentou-se mais
 140 ácida que daqueles de PC ($P < 0,05$) enquanto os valores de LP-RAS e LP foram
 141 intermediários (Tabela 2). Na mesma situação foi verificada na porção pilórica, em RAS-
 142 TR e PC apresentando as condições mais e menos ácidas respectivamente com LP e LP-
 143 RAS sendo intermediários.

144 Já o pH da porção pilórica foi mais alto em PC ($6,61 \pm 0,17$) e mais ácido em RAS-
145 TR ($4,10 \pm 0,10$) ($P < 0,05$; Tabela 2)

146 A partir dos cecos pilóricos (CP) o pH foi semelhante entre as diferentes porções do
147 intestino quanto entre as diferentes origens ($P < 0,05$), exceto no intestino médio onde os
148 peixes do RAS-TR apresentaram a maior média em relação a LP-RAS e PC ($P < 0,05$;
149 Tabela 2).

150

151 Tabela 2. Valores de pH da cárdia, piloro, cecos pilóricos (CP), intestino proximal (IP),
152 médio (IM) e distal (ID) de tainhas (*Mugil liza*) de diferentes origens.

Ori gem§	Cárdia	Piloro	CP	IP	IM	ID
PC	$6,02 \pm 0,74a$	$6,61 \pm 0,42a$	$6,53 \pm 0,28$	$6,53 \pm 0,25$	$6,67 \pm 0,19b$	$6,66 \pm 0,28$
RAS-TR	$4,56 \pm 0,19b$	$4,10 \pm 0,22b$	$6,83 \pm 0,10$	$6,92 \pm 0,03$	$7,01 \pm 0,08a$	$7,08 \pm 0,06$
LP	$5,57 \pm 0,81$	$5,10 \pm 0,06$	$6,78 \pm 0,20$	$6,83 \pm 0,11$	$6,78 \pm 0,07$	$6,65 \pm 0,64$
LP-RAS	$5,53 \pm 0,20$	$5,57 \pm 0,68$	$6,37 \pm 0,51$	$6,79 \pm 0,21$	$6,70 \pm 0,14$	$6,92 \pm 0,24$

153 § PC: Praia do Cassino; LP: Lagoa dos Patos; LP-RAS: Lagoa dos Patos e mantidos por 147 dias em
154 sistema de recirculação de água; RAS-TR: Sistema de recirculação de água e mantidos por 54 dias em
155 tanque rede. Nota: Colunas com letras minúsculas indicam comparação dentro das menores faixas de peso,
156 pelo teste *t* de Student. Em todos os casos considerou-se $P < 0,05$; Dados apresentados como média $\pm$ SD;
157 $n=5$

158 **Histologia**

159 O estômago da *M. liza* posiciona-se na cavidade abdominal com a porção cárdica
160 voltada para a região caudal e a pilórica para a cranial (Figura 1). Dois CP com diferenças
161 merísticas estão localizados entre o final da porção pilórica estomacal e o início do
162 intestino proximal, de modo que há uma área de comunicação comum entre CP, IP e
163 piloro. O intestino é enovelado (Figura 1) e se afunila à medida que se discorre para a
164 parte distal, com uma redução gradativa no diâmetro.

165 Os cecos são formados por uma parede muscular fina com uma camada muscular
166 externa longitudinal e uma camada muscular circular interna. A mucosa é

167 altamente pregueada, com epitélio constituído de células colunares e uma grande
168 distribuição de células caliciformes (Figura 2).

Figura 1 – Trato digestório da *M. liza* sem o baço e o fígado para melhor visualização do estômago e cecos.

169

170

171

172

173

174

Fig. 2 Cecos pilóricos corados com P.A.S (A) em corte transversal com aumento de 40, V= vilosidades; ME = muscular externa; Cc= camada circular (interna da muscular externa); Cl = camada longitudinal (externa) da muscular externa; e (B) corte longitudinal com aumento de 400x; A seta está indicando um *villus*; * = células caliciformes; ponta da seta = enterócitos.

175

176

Através de uma análise subjetiva, o ID apresentou mais células caliciformes que os CP, seguidos pelo IP e IM (Tabela 3).

177 Tabela 3. Distribuição de células caliciformes nas porções dos cecos pilóricos (CP),
 178 intestino proximal (IP), médio (IM) e distal (ID) de tainhas (*Mugil liza*) de diferentes
 179 origens.

Origem§	CP	IP	IM	ID
PC	++	+	+	+++
RAS-TR	++	+	+	+++
LP	++	+	+	+++
LP-RAS	++	+	+	+++

180 § PC: Praia do Cassino; LP: Lagoa dos Patos; LP-RAS: Lagoa dos Patos e mantidos por 147 dias em
 181 sistema de recirculação de água; RAS-TR: Sistema de recirculação de água e mantidos por 54 dias em
 182 tanque rede.

183 Legenda: + = Pouco; ++ = Intermediário; +++ = Muito.

184

185

Discussão

186 As análises morfológicas do trato digestivo são essenciais para a compreensão da
 187 biologia das espécies, da fisiologia e para a criação de peixes, conforme observado em
 188 outros estudos como Buddington et al. (1986), Galvão et al. (1997) e Olsson (2011).

189 A cavidade oral da *M. liza* é revestida por um epitélio estratificado com abundantes
 190 células mucosas, e pregas complexas e ramificadas no esôfago (Galvão et al., 1997). Já o
 191 estômago da *M. liza* é dividido em duas porções com funções digestivas (Galvão et al.,
 192 1997) e que, embora não se tenha estudos específicos, possivelmente atue na absorção de
 193 alguns nutrientes como relatado para outras espécies de peixes (Bakke et al. 2011).

194 A porção cárdica realiza a digestão química com a produção de ácido clorídrico e
 195 pepsinogênio, desnaturando proteínas e facilitando o rompimento das estruturas celulares
 196 na porção pilórica (moela) através da contração da espessa musculatura lisa, o que causa
 197 desgaste das partículas µm do alimento quando misturado com areia (Cardona, 2016;
 198 Galvão et al., 1997).

199 É notório que, embora o material orgânico e energia se concentrem nas menores
 200 frações do detrito (Cardona, 2016) e os Mugilídeos consigam selecionar partículas tão

201 finas quanto 50 micras (Blay, 1995; Stephen et al., 1976), ainda assim ingerem areia,
202 formando juntamente com detrito o componente principal da dieta (Oliveira et al., 1996).

203 Além da maceração do substrato presente no piloro supõe-se que a areia colabore
204 com a digestão dos componentes presentes no intestino, pois a distensão da musculatura
205 do estômago ocasiona um aumento no fluxo sanguíneo intestinal (Seth et al., 2009)
206 desencadeando a liberação de enzimas digestivas (Santigosa et al., 2008).

207 Adicionalmente, é provável que a areia aumente o contato das enzimas com o
208 substrato por evitar a agregação das finas partículas orgânicas e promover contrações da
209 musculatura do estômago e intestino devido ao estímulo causado nas fibras nervosas
210 sensoriais da mucosa (Olsson et al., 2001). Possivelmente, devido a essas interações
211 positivas do TGI das tainhas com a areia que 100% dos indivíduos maiores que 2 cm a
212 ingerem (Eggold et al., 1992).

213 Os peixes capturados na PC e LP no presente estudo apresentavam areia ao longo de
214 todo o TGI, com exceção dos cecos pilóricos, concordando com o relatado por Payne
215 (1978) em quatro Mugilídeos do Leste da África.

216 Da mesma forma, o valor de ICE dos peixes do ambiente foram similares aos
217 relatados por Dankwa et al. (2005) que encontraram valores máximos em torno de 0,8%
218 para a *M. curema* e *M. bananensis*. Possivelmente, devido aos constantes estímulos de
219 distensão e contração muscular causados pela areia que os valores de IE e ICE foram
220 maiores nos peixes do ambiente. No entanto, devido à densidade e qualidade nutricional
221 da ração utilizada, o valor de 0,52% de ICE dos peixes de cativeiro não seria um fator
222 limitante para o crescimento se tomados os devidos cuidados quanto à frequência
223 alimentar.

224 Considerando que o uso de alimentos com grânulos maiores é uma estratégia adotada
225 para frangos de corte, para aumentar o peso da moela e melhorar a conversão alimentar
226 (Truong et al., 2017), torna-se interessante a disponibilização de areia às tainhas,
227 assumindo que ela é responsável pelo o aumento da moela, a qual é comercializável.

228 Embora com capacidade limitada na *M. liza*, o estômago serve como reservatório e
229 um importante local de degradação do alimento, auxiliado pela liberação de ácido e
230 enzimas (Olsson, 2011). O pH do estômago dos Mugilídeos no ambiente varia entre as
231 espécies sendo considerado alcalino para *Liza dumerili* por situar-se em torno de 8,0 e o
232 oposto para *Liza falcipinnis* próximo de 4,0 (Payne, 1978) e 6,6 para *Rhinomugil corsula*

233 (Gupta, 1981) sendo as duas últimas espécies próximas aos valores encontrados no
234 presente estudo, os quais variaram de 4,56 a 6,02 para as tainhas criadas em tanque rede e
235 capturadas na praia do Cassino, respectivamente.

236 Alterações no pH estomacal dos peixes podem ocorrer devido ao nível proteico da
237 dieta (Fracalossi et al., 2012). Palanisamy (1989) verificou que em *Liza parsia* a pepsina
238 aumentava sua atividade após serem alimentadas e que os peixes que consumiram uma
239 ração mais proteica tiveram uma maior produção de enzimas proteolítica. Todavia,
240 dependendo do volume de alimento consumido, o suco gástrico pode ser diluído,
241 conduzindo a uma menor condição digestiva ácida (Segovia-Quintero et al, 2004). Assim,
242 supõe-se que as diferenças no pH estomacal ocorreram devido ao alimento mais
243 concentrado, uma vez que as tainhas mantidas em RAS-TR ingeriram ração horas antes
244 de serem coletadas. No entanto, as tainhas provenientes do LP-RAS passaram por um
245 período de jejum anterior às análises, motivo pelo qual apresentaram valores semelhantes
246 às do ambiente (PC e LP). Apesar da menor condição ácida do estômago comum aos
247 Mugilídeos, o processo de trituração na moela é relatado ser igualmente eficiente (Wilson
248 et al., 2011).

249 Como o piloro não produz suco gástrico (Galvão et al., 1997), seu pH é diretamente
250 influenciado pelo alimento que chega da cárdia, o que foi demonstrado pela correlação
251 positiva entre o pH das duas regiões ($P < 0,001$; $r^2 = 0,82$).

252 Nos Mugilídeos o número de CP é uma característica para a identificação a nível de
253 gênero (Cardona, 2016), sendo um órgão que possui as mesmas funções do intestino,
254 inclusive com atividade enzimática (Trellu et al., 1978; Guizani et al., 1991) e com
255 capacidade de aumentar a superfície de absorção (Rahimulla et al., 1944; Eggold et al.,
256 1992; Drake et al., 1984). Diferentemente da tainha australiana (*V. georgii*) que apresenta
257 um grande número de cecos distribuídos na porção inicial do intestino (Thomson, 1954),
258 na *M. liza* são encontrados apenas dois CP com diferenças merísticas (Figura 1) e mucosa
259 altamente pregueada (Figura 2), apresentando uma região comum entre eles, o esfíncter
260 pilórico e o IP.

261 A literatura refere-se aos cecos pilóricos como uma estrutura morfológica adicional
262 para aumentarem sua área de absorção, principalmente em carnívoros já que seus
263 intestinos são curtos (Wilson et al., 2010; Olsson, 2011; Fracalossi et al., 2012;
264 Dabrowski et al., 2005). Nesse sentido pode-se dizer subjetivamente que, nos Mugilídeos,

265 o número de cecos diminui à medida que o intestino se prolonga, com uma estrita relação
 266 com proporção de matéria orgânica e inorgânica da dieta (Tabela 4) .

267

268 Tabela 4. Número de cecos pilóricos, presença de areia no trato, quociente intestinal (QI) e os
 269 tipos de alimento predominante em juvenis de diferentes espécies de mugilídeos de ambiente.

Espécie	Nº de cecos	QI	Presença de areia no trato	Alimento predominante	Referências
<i>Mugil liza</i>	2¶	3,3 – 4,0¶	+++	Diatomáceas e detritos	Roselet, 2005
<i>Mugil cephalus</i>	2	3,2 – 4,6	+++	Diatomáceas e detritos	Eggold et al., 1992
<i>Liza ramada</i>	7-8	2,9 -3,4	++	Detritos, microfitobentos e meiofauna*	Cardona, 2016
<i>Paramugil georgii</i>	22	-	+	Copépodes, algas filamentosas e diatomáceas	Thomson, 1954

270 Nota: + = Pouco; ++ = Regular; +++ = Muito. ¶ - Presente estudo. * (ostracodes, copépodes,
 271 nematóides).

272

273 No presente estudo, o pH dos CP e do IP de todos os peixes foi similar, independente
 274 da origem. Payne (1978) encontrou a mesma situação com a *Liza falcipinnis* e sugeriu
 275 que o conteúdo dos CP não é proveniente diretamente do estômago, mas do refluxo do IP.
 276 O autor ainda acrescenta que, pelo fato de raramente encontrar areia nos CP, isso seria
 277 um mecanismo para separar a fração grosseira das finas partículas orgânicas da digesta.

278 De maneira geral, o pH das diferentes porções do intestino não apresentou diferença
 279 nem entre os indivíduos dos diferentes ambientes (com exceção do IM), apesar das
 280 diferenças no estômago, confirmando a necessidade manter um ambiente adequado à
 281 ação enzimática e absorção (Krogdahl et al., 2011).

282 Considerando que a neutralização do quimo ocorre na porção inicial do intestino, o
 283 qual é conduzido até o ânus (Olsson et al., 2001; Bakke et al., 2011), o pH mais elevado
 284 encontrado no IM das tainhas do RAS-TR pode ser devido à maior liberação de

285 bicarbonato em consequência da maior acidez na porção pilórica do estômago ($P=0,08$;
286 $r^2= -0,39$).

287 Os CP juntamente com o IP são responsáveis pela absorção da maior parte dos
288 nutrientes do alimento, seguidos pelo IM e ID (Nordrum et al., 2000). Nas porções
289 iniciais ocorre a absorção, principalmente de aminoácidos, monossacarídeos e ácidos
290 graxos via difusão, transporte facilitado e transporte dependente de Na^+ , Cl^- , K^+ ou H^+
291 enquanto no ID ocorre a absorção de macromoléculas via pinocitose (Bakke et al., 2011;
292 Baldisserotto, 2013).

293 O CI dos peixes é bastante variável entre as diferentes espécies e em menor grau
294 entre indivíduos da mesma espécie com tamanho semelhante (Baldisserotto, 2013). Essa
295 variação foi observada na pesquisa de Roselet (2005) com a *M. liza* que apresentou QI
296 entre 1,6 e 3,1. No presente estudo comparando as tainhas de mesmo tamanho (PC×RAS-
297 TR e LP×LP-RAS), verificou-se que as capturadas no ambiente apresentavam o CI e QI
298 maior que as de criação. Além disso, ficou demonstrado através dos peixes das origens
299 LP e LP-RAS que a mudança de ambiente e, conseqüentemente, de alimento causou essas
300 mudanças na morfometria do TGI.

301 As teorias em torno dessas mudanças discorrem a respeito da presença de material
302 indigestível na dieta, as vantagens nutricionais e energéticas com a maior ou menor
303 permanência do alimento no TGI (German, 2011) ou ainda sobre o tecido intestinal servir
304 de reserva proteica quando em situação de jejum ou de balanço energético negativo
305 (Krogh et al., 2005). No entanto, não há esclarecimentos se os estímulos de “up” e
306 “down-regulation” partem do próprio epitélio intestinal, do sistema nervoso central ou de
307 ambos.

308 Olsson et al. (2007) verificaram que, em cerca de 2 meses, o fornecimento de uma
309 dieta menos digestível (quironomídeos congelados) causou um aumento no CI dos
310 juvenis de perca (*Perca fluviatilis*) quando comparado ao fornecimento de artêmia (mais
311 digestível), mas sem afetar o crescimento. Por outro lado, German et al. (2010) relataram
312 que cascudos (*Pterygoplichthys disjunctivus*) alimentados com serragem por 5 meses
313 perderam mais peso que aqueles em jejum por igual período e, ao invés de aumentar o
314 TGI pela baixa digestibilidade do alimento, este diminuiu. No primeiro estudo os autores
315 relataram ser uma adaptação para melhorar o aproveitamento do alimento e no segundo
316 uma questão de conservação de energia em vista da crônica baixa qualidade da dieta.

317 Uma teoria que pode explicar mais precisamente essas alterações no CI é o fato de
318 que os enterócitos, possivelmente, se utilizam de parte dos nutrientes que atravessam seu
319 citosol em direção à corrente sanguínea, desencadeando estímulos internos para a maior
320 ou menor multiplicação celular dependendo da permanência do fluxo (Ross et al., 2016).

321 Nesse contexto vale salientar que o intestino consome 20% da energia metabolizável
322 adquirida (Cant et al., 1996) e que o transporte íon-dependente utiliza ATP para a
323 manutenção do gradiente iônico (Baldisserotto, 2013), configurando as células das
324 porções iniciais e média do intestino como mais exigentes. Já o ID colabora pouco com a
325 absorção porque uma pequena quantidade de nutrientes chega nessa região, uma vez que
326 cerca de 75% é absorvido nas porções anteriores (Nordrum et al., 2000), embora a
327 pinocitose não gaste energia (Baldisserotto, 2013).

328 Com base nessas informações pode-se dizer que o intestino é tão longo quanto a
329 quantidade de nutrientes que chega ao final da porção distal seja suficiente para, pelo
330 menos, manter as células. Em outras palavras, o aumento da quantidade de nutrientes que
331 chega ao ID estimula a proliferação dos enterócitos dessa região e, conseqüentemente, de
332 todas as anteriores por onde passou, alongando o intestino a partir do momento em que o
333 máximo desenvolvimento das vilosidades tiver ocorrido. No entanto, para isso acontecer,
334 o alimento ingerido deve ser de lenta digestão (e não indigestível).

335 Portanto, as tainhas de criação apresentaram um menor CI e QI devido a grande
336 maioria dos componentes da ração fornecida apresentarem uma digestão e absorção mais
337 rápida, faltando nutrientes para as porções mais distais.

338 Considerando que os CP, IP e IM ao absorver o máximo de nutrientes, impedem que
339 uma grande quantidade de nutrientes livres alcance a porção distal e que os mesmos são
340 utilizados como substrato para as bactérias ou então excretados, sugere-se que as
341 diferenças morfológicas dos Mugilídeos estejam relacionadas à proporção e frequência da
342 ingestão de componentes de rápida e lenta digestão.

343 O conteúdo presente no ID é repleto de íons não absorvidos (Baldisserotto, 2013),
344 material não digerido e indigestível (Krogdahl et al., 2011), os quais servem de substrato
345 para bactérias (Jutfelt, 2011). Nesse ambiente rico em bactérias, destacam-se as células
346 caliciformes, as quais produzem muco que atua na proteção dos enterócitos (Mccauley et
347 al., 2015).

348 Pouco é conhecido sobre a relação das células caliciformes com a dieta em peixes,
349 mas já se sabe que sofrem estímulos externos para produção e liberação de mucinas (Díaz
350 et al., 2008). Van der Marel et al. (2014) ao substituir a proteína animal por proteína de
351 soja em *Cyprinus carpio* verificou que ocorrem alterações na produção e composição das
352 mucinas, principalmente na porção inicial do intestino, que ocasionou inflamações nos
353 enterócitos e o crescimento da comunidade bacteriana.

354 As mucinas exercem um importante papel na manutenção do tecido, com função
355 antimicrobiana na mucosa epitelial, especialmente na região distal (Inami et al., 2009).
356 Além disso, facilita o transporte das macromoléculas através da membrana (Díaz et al.,
357 2008), protege e lubrifica o epitélio (McCauley et al., 2015), julgando-se altamente
358 necessárias para a *M. liza* as duas últimas funções, pelo fato de ocorrer um afunilamento
359 ao longo de seu trato e pela elevada ingestão componentes abrasivos.

360 Nas áreas de absorção dos nutrientes observam-se mais mucinas sulfatadas, as quais
361 absorvem mais água, devido às propriedades particulares, promovendo uma melhor
362 eficiência no processo (Leknes, 2011). Assim, admitindo que os CP são áreas para
363 aumentar a absorção e que retém na sua maioria partículas selecionadas, sugere-se que a
364 maior concentração de células caliciformes nessa região em relação à porção proximal e
365 média seja pelo fato de conter uma maior concentração de nutrientes.

366 Assim, a heterogeneidade na distribuição das células caliciformes mostra as
367 diferentes funções desempenhadas pelas diferentes mucinas ao longo do TGI.

368

Conclusões

369 Conclui-se que o alimento disponível causa alterações morfofisiológicas no trato
370 gastrointestinal da *Mugil liza*, diminuindo o peso do estômago e o comprimento do
371 intestino quando sua dieta é baseada em alimentos de mais fácil digestão. O consumo de
372 ração deixa o pH do estômago mais ácido, no entanto, nos cecos pilóricos e no intestino o
373 pH não é alterado pela dieta. Além disso, os cecos pilóricos têm estruturas histológicas
374 similares ao intestino proximal, porém com maior número de células caliciformes.
375 Finalmente, as células caliciformes são mais abundantes na porção distal do trato,
376 conferindo uma função protetora e lubrificante.

Referências bibliográficas

377

378 Bakke, A. M.; Glover, C.; Krogdahl, Å., 2011: Feeding, digestion and absorption of
379 nutrients. In: Grosell, M., A. P. Farrell & C. J. Brauner (eds.), *The Multifunctional Gut of*
380 *Fish*. Academic Press, pp. 57–110

381 Baldisserotto, B., 2013: *Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura* 3rd edn. UFSM,
382 Santa Maria

383 Barletta, M.; Dantas, D. V., 2016: Biogeography and Distribution of Mugilidae in the
384 Americas

385 Blay, J., 1995: Food and feeding habits of four species of juvenile mullet (Mugilidae) in a
386 tidal lagoon in Ghana. *Journal of Fish Biology.*, **46**, 134–141

387 Cant, J. P.; McBride, B. W.; Croom, W. J., 1996: The regulation of intestinal metabolism
388 and its impact on whole animal energetics. *Journal of Animal Science.*, **74**, 2541–2553

389 Cardona, L., 2016: Food and Feeding of Mugilidae. *Biology, Ecology and Culture of*
390 *Grey Mulletts (Mugilidae)*. Taylor and Francis Group, pp. 165–195

391 Conrad, J. L.; Weinersmith, K. L.; Brodin, T.; Saltz, J. B.; Sih, A., 2011: Behavioural
392 syndromes in fishes: A review with implications for ecology and fisheries management.
393 *Journal of Fish Biology.*, **78**, 395–435

394 Dankwa, H. R.; Blay Jr, J.; Yankson, K., 2005: Food and feeding habits of grey mullets
395 (Pisces: Mugilidae) in two estuaries in Ghana. *West African Journal of Applied Ecology.*,
396 **8**, 1–13

397 Dabrowski, K.; Portella, M. C., 2005: Feeding Plasticity and Nutritional Physiology in
398 Tropical Fishes. *Fish Physiology.*, Vol. 21pp. 155–224

399 Díaz, A. O.; García, A. M.; Goldemberg, A. L., 2008: Glycoconjugates in the mucosa of
400 the digestive tract of *Cynoscion guatucupa*: A histochemical study. *Acta Histochemica.*,
401 **110**, 76–85

402 Drake, P.; Arias, A. M., 1984: Biología de los Múgildeos (Osteichthyes, Mugilidae) en
403 los esteros de las alinas de San Fernando (Cádiz). III. Hábitos alimentarios y su relación
404 con la morfometría del aparato digestivo. *Investigacion Pesquera.*, **48**, 337–367

405 Eggold, B. T.; Motta, P. J., 1992: Ontogenetic dietary shifts and morphological correlates
406 in striped mullet, *Mugil cephalus*. *Environmental Biology of Fishes.*, **34**, 139–158

407 Fracalossi, D. M., Cyrino, J. E. P. Nutriaqua: nutrição e alimentação de espécies de
408 interesse para aquicultura brasileira. Florianópolis, SC, 2012.

409 Galvão, M. S. N.; Fenerich-Verani, N.; Yamanaka, N.; Oliveira, I. R., 1997: Histologia
410 do sistema digestivo da tainha *Mugil platanus* Günther, 1880 (Osteichthyes, Mugilidae)
411 durante as fases larval e juvenil. *Boletim do Instituto de Pesca.*, **24**, 91–100

412 Gaylord, T. G.; Barrows, F. T.; Rawles, S. D., 2008: Apparent digestibility of gross
413 nutrients from feedstuffs in extruded feeds for rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*.
414 *Journal of the World Aquaculture Society.*, **39**, 827–834

- 415 German, D. P.; Neuberger, D. T.; Callahan, M. N.; Lizardo, N. R.; Evans, D. H., 2010:
416 Feast to famine: The effects of food quality and quantity on the gut structure and function
417 of a detritivorous catfish (Teleostei: Loricariidae). *Comparative Biochemistry and*
418 *Physiology, Part A.*, **155**, 281–293
- 419 German, D. P., 2011: Digestive efficiency. *Encyclopedia of Fish Physiology: From*
420 *Genome to Environment*. Elsevier Inc., Vol. 3pp. 1596–1607
- 421 Guizani, N.; Rolle, R. S.; Marshall, M. R.; Wei, C. I., 1991: Isolation, purification and
422 characterization of trypsin from the pyloric caeca of mullet (*Mugil cephalus*). *Comparative*
423 *Biochemistry and Physiology - B.*, **98**, 517–521
- 424 Gupta, S. B. C., 1981: Food and Feeding Habits and Physiology of Digestion in. Certain
425 Riverine Teleosts. *Proceedings of the Indian National Science Academy.*, **6**, 837–844
- 426 Inami, M.; Taverne-Thiele, A. J.; Schröder, M. B.; Kiron, V.; Rombout, J. H. W. M.,
427 2009: Immunological differences in intestine and rectum of Atlantic cod (*Gadus morhua*
428 L.). *Fish & Shellfish Immunology.*, **26**, 751–759
- 429 Jutfelt, F., 2011: Barrier Function of the Gut. In: Farrel, A. P. (ed.), *Encyclopedia of Fish*
430 *Physiology: From Genome to Environment*. Elsevier, New York, Vol. 2pp. 1322–1331
- 431 Krogdahl, Å.; Bakke-Mckellep, A. M., 2005: Fasting and refeeding cause rapid changes
432 in intestinal tissue mass and digestive enzyme capacities of Atlantic salmon (*Salmo salar*
433 L.). *Comparative Biochemistry and Physiology - A.*, **141**, 450–460
- 434 Krogdahl, Å.; Sundby, A.; Bakke, A. M., 2011: Gut secretion and digestion. In: Farrel, A.
435 P. (ed.), *Encyclopedia of Fish Physiology: From Genome to Environment*. Elsevier, New
436 York, Vol. 2pp. 1301–1310
- 437 Lemos, V. M.; Jr, A. S. V.; Schwingel, P. R.; Muelbert, J. H., 2014: Migration and
438 reproductive biology of *Mugil liza* (Teleostei: Mugilidae) in south Brazil. *Journal of Fish*
439 *Biology.*, **85**, 671–687
- 440 McCauley, H. A.; Guasch, G., 2015: Three cheers for the goblet cell: maintaining
441 homeostasis in mucosal epithelia. *Trends in Molecular Medicine.*, **21**, 492–503
- 442 Menezes, N. A.; Nirchio, M.; Oliveira, C.; Siccharamirez, R., 2015: Taxonomic review of
443 the species of *Mugil* (Teleostei: Perciformes: Mugilidae) from the Atlantic South
444 Caribbean and South America, with integration of morphological, cytogenetic and
445 molecular data. *Zootaxa.*, **3918**, 1–38
- 446 Nordrum, S.; Krogdahl, Å.; Røsjø, C.; Olli, J. J.; Holm, H., 2000: Effects of methionine,
447 cysteine and medium chain triglycerides on nutrient digestibility, absorption of amino
448 acids along the intestinal tract and nutrient retention in Atlantic salmon (*Salmo salar* L.)
449 under pair-feeding regime. *Aquaculture.*, **186**, 341–360
- 450 Okamoto, M. H.; Sampaio, L. A.; Maçada, A. P., 2006: Efeito da temperatura sobre o
451 crescimento e a sobrevivência de juvenis da tainha *Mugil platanus* Günther, 1880.
452 *Atlântica.*, **28**, 61–66
- 453 Oliveira, I. R.; Soares, L. S. H., 1996: Alimentação da Tainha *Mugil platanus* Günther,
454 1880 (Pisces: Mugilidae), da Região Estuarino-Lagunar de Canaéia, São Paulo, Brasil.
455 *Boletim do Instituto de Pesca.*, **23**, 95–104

- 456 Olsson, C.; Holmgren, S., 2001: The control of gut motility. *Comparative Biochemistry*
457 *and Physiology - A.*, **128**, 481–503
- 458 Olsson, J.; Quevedo, M.; Colson, C.; Svanbäck, R., 2007: Gut length plasticity in perch:
459 into the bowels of resource polymorphisms. *Biological Journal of the Linnean Society*,
460 **90**, 517–523
- 461 Payne, A. I., 1978: Gut pH and digestive strategies in estuarine grey mullet (Mugilidae)
462 and tilapia (Cichlidae). *Journal of Fish Biology.*, **13**, 627–629
- 463 Petkam, R.; Moodie, G. E. E., 2001: Food particle size, feeding frequency, and the use of
464 prepared food to culture larval walking catfish (*Clarias macrocephalus*). *Aquaculture*,
465 **194**, 349–362
- 466 Rahimulla, R., OSMANIA, F. Z. S. A comparative study of the morphology, histology an
467 probable functions of the pyloric caeca in indian fishes, together with a discussion on
468 their homology. *Fisheries OJflcer*, p. 1–41, 1944.
- 469 Roselet, F. F. G., 2005: *Considerações ecológicas sobre o habito alimentar iliógago dos*
470 *juvenis da tainha Mugil platanus Günther, 1880 no estuário da lagoa dos patos e região*
471 *costeira adjacente, RS - Brasil*. Fundação Universidade Federal do Rio Grande
- 472 Ross, M. H.; Pawlina, W., 2016: *Histologia Texto e Atlas: Correlação com Biologia*
473 *Celular e Molecular 7th* . Guanabara Koogan, Rio de Janeiro
- 474 Sampaio, L.; Wasielesky, W. J.; Miranda-Filho; KC, 2002: Effect of salinity on acute
475 toxicity of ammonia and nitrite to juvenile Mugil platanus. *Bulletin of Environmental*
476 *Contamination and Toxicology.*, **68**, 668–674
- 477 Santigosa, E.; Sánchez, J.; Médale, F.; Kaushik, S.; Pérez-Sánchez, J.; Gallardo, M. A.,
478 2008: Modifications of digestive enzymes in trout (*Oncorhynchus mykiss*) and sea bream
479 (*Sparus aurata*) in response to dietary fish meal replacement by plant protein sources.
480 *Aquaculture*, **282**, 68–74
- 481 Segovia-Quintero, M. a.; Reigh, R. C., 2004: Coating crystalline methionine with
482 tripalmitin-polyvinyl alcohol slows its absorption in the intestine of Nile tilapia,
483 *Oreochromis niloticus*. *Aquaculture*, **238**, 355–367
- 484 Seth, H.; Sandblom, E.; Holmgren, S.; Axelsson, M., 2008: Effects of gastric distension
485 on the cardiovascular system in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *American Journal*
486 *of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, **294**, 1648–1656
- 487 Stephen, J. M.; Blaber, F. L. S., 1976: The food and feeding ecology of Mugilidae in the
488 St. Lucia lake system. *Biological Journal of the Linnean Society*, **8**, 267–277
- 489 Thomson, B. J. M., 1954: The organs of feeding and the food of some Australian mullet.
490 *Aust. J. Mar. Freshw. Res.*, **5**, 469–485
- 491 Trellu, J., Albertini-Berhaut, J. Caractérisation de Quelques Activités Enzymatiques
492 Digestives chez Mugil capito en Relation avec la Taille. *Biochemical Sysrematics and*
493 *Ecology*, v. 6, p. 255–259, 1978

- 494 Webb, K. A.; Rawlinson, L. T.; Holt, G. J., 2010: Effects of dietary starches and the
495 protein to energy ratio on growth and feed efficiency of juvenile cobia, *Rachycentron*
496 *canadum*. *Aquaculture Nutrition*, **16**, 447–456
- 497 Whitfield, A. K., 2016: Ecological Role of Mugilidae in the Coastal Zone. In: Crosetti, D.
498 & S. Blaber (eds.), *Biology, Ecology and Culture of Grey Mulletts (Mugilidae)*. CRC
499 Press, pp. 324–348
- 500 Wilson, J. M.; Castro, L. F. C., 2011: Morphological diversity of the gastrointestinal tract
501 in fishes. In: Grosell, M., A. P. Farrell & C. J. Brauner (eds.), *The Multifunctional Gut of*
502 *Fish*. First Edit. Elsevier, Vol. 30pp. 1–55