

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Estrogênios: doses e vias de administração

<i>Estrogênios / doses e vias</i>	
Via oral / dose	Estrogênios conjugados (EC) 0,5 -0,45 – 0,625 – 1,25mg/dia 17- β -estradiol micronizado (E ₂) 1 – 2 mg/dia Hemisuccinato de estradiol (HE) 1,5 mg/dia
Via transdérmica	Estradiol transdérmico (E ₂) 25 -50 – 100
Via nasal	Estradiol gel (E ₂) 0,5 – 1 – 3 mg/dia Estradiol intranasal (E ₂) 150 300 mcg/dia
Via subcutânea	Estradiol implante (E ₂) 25 mg cada 6 meses

FONTE: Adaptado de MELO, POMPEI, MACHADO, FERNANDES, 2004.

Tabela 2 – Classificação dos progestogênios

TESTOSTERONA		PROGESTERONA	
19 – Nortestoteronas		17 - Hidroxiprogesterona	
Estranos (C18)	Gonanos (C17)	Pregnanos (C21)	
Noretildronel	Levonergestrel	Acetilados	Não Acetilados
G1	G2	Medroxiprogesterona	Didrogesterona
Norestiterona	Desogestrel		
(Norestiterona)	(Etonogestrel)	Ciproterona	
G2	Gestodeno	Megestrol	
Dienogeste	Norgestimato	Clormadinona	
(Híbrido) ¹	(Norelgestromina)	Espironolactona	
	G3	Drospirenona	
	19 - Norprogesterona	1 Grupo 17a etinil	
	Nor-pregnanos ²	substituído por 17 ^a	
	Nomegestrol	cianometil	
	Nestorona	2 Progestágenos “puros”	
	Trimegestona		

FONTE: Adaptado por Bossemeyer, R. (2004)

Tabela 3 – Progestogênios: doses e vias de administração

<i>Progestogênios</i>	
Via oral	
Acetato de medroxiprogesterona (AMP)	1,5 – 2,5 – 10 mg/dia
Acetato de ciproterona (AC)	1 – 2 mg/dia
Acetato de noretisterona (NETA)	0,35 mg/dia
Acetato de nomegestrel (ANG)	0,35 – 0,5 – 0,7 – 1 mg/dia
Didrogesterona	2,5 – 5 mg/dia
Dienogest	2mg/dia
Norgestimato	90 mcg 3/3 dias
Progesterona micronizada	100 – 200 – 300 mg/dia
Trimegestona	0,125 – 0,25 mg/dia
Via transdérmica	
Acetato de noretisterona (NETA)	140 – 170 – 250 mcg/dia

FONTE: Adaptado de MELO, POMPEI, MACHADO, FERNANDES, 2004.

Tabela 4 – Androgênios: doses e vias de administração.

<i>Androgênios</i>		
Via oral		
Metil testosterona		1,25 – 2,5 – 5 mg/dia
Undecanoato de testosterona		40 mg/dia
Via transdérmica		
Propionato de testosterona 2%		2mg/dia
Parenteral		
Cipionato de testosterona		50 - 100mg/dia
Enantato de testosterona		50 – 100mg/dia
Implante de testosterona		25mg 6/6 meses
Estrogênio / androgênio		
Benzoato / Fenilpropionato de estradiol		5mg/mês
Benzoato / Fenilpropionato / Isocaproato de testosterona		100mg/mês

FONTE: Adaptado de MELO, POMPEI, MACHADO, FERNANDES, 2004.

Tabela 5 – Dados das pacientes do WHY, braço da TEPcc (em percentuais)

<i>WHI - TEPcc</i>	<i>TH</i> <i>n= 8506</i>	<i>Placebo</i> <i>n^a= 8102</i>
Idade na seleção	63,2	63,3
Uso prévio de hormônio	26,1	25,6
IMC	28,5	28,5
Tabagistas ou ex-tabagistas	50,4	50
Diabete	4,4	4,4
Hipertensão	37,5	36,4
Uso de Estatinas	6,9	6,8
Antecedentes familiares de Câncer de mama	16	15,3
Antecedentes de infarto do miocárdio	1,6	1,9
Antecedentes pessoais de Revascularização/ angioplastia	1,1	1,5

FONTE: WRITING GROUP FOR THE WOMEN'S HEALTH INITIATIVE INVESTIGATORS, 2002.

WHI – Women's Health Initiative Study; TEPcc – terapia estroprogestogênica combinada contínua; IMC – infarto agudo do miocárdio.

Tabela 6 – RR, número e diferença de eventos clínicos entre os grupos do WHI, braço TEPcc.

<i>Eventos Clínicos</i>	<i>Risco Relativo</i>	<i>Grupo Placebo n° de casos para 10 mil mulheres/ano</i>	<i>Grupo TH n° de casos para 10 mil mulheres/ano</i>	<i>Diferença no n° de eventos para 10 mil mulheres/ano</i>
Ataques Cardíacos	1,29	30	37	7
Acidente Vascular Cerebral	1,49	21	29	8
Câncer de Mama	1,26	30	38	8
Trombo Embolismo Venoso	2,11	16	34	18
Câncer de reto e cólon	0,63	16	10	-5
Fraturas de Bacia	0,66	15	10	-6

FONTE: WRINTING GROUP FOR THE WOMEN'S HEALTH INITIATIVE INVESTIGATORS, 2002

Tabela 7 – N° de eventos clínicos, no braço TE, do WHI

	<i>TE</i> <i>Nº (%)</i>	<i>Placebo Nº (%)</i>	<i>Risco</i> <i>Relativo</i>	<i>IC – 95%</i>
Doença cardio-circulatória	177 (0,49)	199 (0,54)	0,91	0,75-1,12
Câncer de mama	94 (0,26)	124 (0,33)	0,77	0,59-1,01

FONTE: THE WHI STEERING COMMITTEE. JAMA. 2004, 291: 1701-1712

Tabela 8 – Características sociodemográficas de mulheres usuárias e não usuárias de TH

<i>Características</i> <i>n = 229</i>	<i>Usuárias de</i> <i>TH</i> <i>n = 61</i>	<i>%</i>	<i>Não usuárias</i> <i>de TH</i> <i>n = 168</i>	<i>%</i>	<i>Nível de</i> <i>Significância</i>
Idade, anos, média (DP)*	49,2 ±5,2		50,9 ± 6,8		p= 0,04 ^a
Estado conjugal, percentagem					
- com companheiro	44	72,1	110	65,5	p=0,43 ^b
- sem companheiro	17	27,9	58	34,5	
Escolaridade					
- até o 2º grau completo	40	65,6	131	78	p= 0,06 ^b
- superior	21	34,4	37	22	
Renda familiar					
- até 2 salários	08	13,1	41	24,4	p< 0,05 ^c
- 03-04 salários	15	24,6	39	23,2	
- 04-05 salários	06	9,8	20	12	
- 05-10 salários	12	19,7	30	17,8	
- + 10 salários	20	32,8	40	22,6	
Ocupação					
- remunerada	44	72,1	99	59	p= 0,07 ^b
- não remunerada	17	27,9	69	41	

^ateste t Student^bteste Exato de Fisher^cteste de tendência linear

Tabela 9 – Distribuição percentual de mulheres usuárias e não usuárias de TH conforme a faixa etária.

<i>Faixa etária</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Com TH</i>	<i>%</i>	<i>Sem TH</i>	<i>(%)</i>	<i>significância</i>
40-44	41	17,9	10	16,4	31	18,4	
45-49	76	33,2	23	37,7	53	31,6	
50-54	51	22,3	20	32,8	31	18,4	
55-59	33	14,4	05	8,2	28	16,7	
60-65	28	12,2	03	4,9	25	14,9	
Total	229	100	61	100	168	100	P=0,17 *

*Teste de tendência linear

Tabela 10 – Distribuição da amostra conforme o estado menopausal.

<i>Estado Menopausal</i>	<i>SEM TH (n = 168)</i>	<i>COM TH (n = 61)</i>
Pré-menopausa	3 (1,8%)	6 (9,8%)
Perimenopausa	61 (36,3%)	16 (26,2)%
Pós-menopausa precoce	55 (32,7%)	25 (41%)
Pós-menopausa tardia	49 (29,2%)	14 (23%)
P de tendência linear=0,48		

Tabela 11 – Distribuição percentual das usuárias de TH segundo o esquema terapêutico.

<i>Esquema terapêutico</i>	<i>Usuárias</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>
TE	10	16,4
TEPcs	25	41
TEPcc	10	16,4
TIBOLONA	8	13,1
OUTRO	8	13,1

Tabela 12 – Distribuição da amostra conforme o número de gestações

<i>Gestações</i>	<i>Com TH</i>	<i>Sem TH</i>	<i>Total</i>
Partos	112 (57,2%)	360 (74,5%)	472
Cesarianas	84 (42,8%)	123 (25,5%)	207
Total	196	483	679

Teste exato de Fisher $p < 0,01$

Tabela 13 – Avaliação dos domínios do QSM

<i>Média dos escores</i>			
Domínio (N)	COM TH (IC_{95%})	SEM TH (IC_{95%})	Significância*
VAS (229)	0.40 (0.29 – 0.51)	0.55 (0.48 – 0.61)	0.02
ANX (229)	0.38 (0.30 – 0.46)	0.49 (0.44 – 0.53)	0.03
MEM (229)	0.44 (0.35 – 0.52)	0.57 (0.52 – 0.63)	0.01
SEX (194)	0.38 (0.29 – 0.46)	0.53 (0.47 – 0.58)	0.003
SLE (229)	0.52 (0.43 – 0.61)	0.58 (0.52 – 0.63)	0.26
MEN (229)	0.45 (0.36 – 0.59)	0.40 (0.35 – 0.45)	0.3
ATT (221)	0.32 (0.22 – 0.42)	0.31 (0.26 – 0.37)	0.8
SOM (229)	0.50 (0.43 – 0.57)	0.60 (0.56 – 0.64)	0.01
DEP (229)	0.23 (0.17 – 0.29)	0.32 (0.28 – 0.36)	0.01

* *teste “T”*

VAS (vasomotor), ANX (ansiedade/temores), MEM (memória, concentração), SEX (sexual), SLE (sono), MEN (menstrual), ATT (atratividade), SOM (somático), DEP (sintomas depressivos).
TH (terapia hormonal).

Tabela 14 – Estudo de Interação entre Renda e TH. Avaliação da qualidade de vida pelos domínios do QSM, avaliação de interação, avaliação da qualidade de vida entre mulheres com + 5 salários e menos de 5 salários usuárias ou não de TH.

	<i>Qualidade de Vida</i>	<i>Interação Renda/TH</i>	<i>QV com e sem TH , +5salários e – 5 salários</i>
Sintomas depressivos	p<0,05	p>0,05	p<0,01
Sintomas somáticos	p<0,05	p>0,05	p>0,05
Sintomas vasomotores	p<0,05	p=0,10	p<0,05
Sexual	p<0,05	p>0,05	p<0,05
Ansiedade/temores	p<0,05	p>0,05	p<0,01
Sono	p>0,05	p>0,05	p<0,05
Menstruais	p>0,05	p>0,05	p>0,05
Atratividade	p>0,08	p=0,09	p>0,05
Memória e concentração	p<0,05	p>0,05	p<0,05

Análise de Variância Fatorial 2x2, e teste post-hoc de Tukey, significância p<0,05.

QV:qualidade de vida; TH: terapia hormonal; QSM (questionário de saúde da mulher).

